

颈部瘢痕挛缩_整形外科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式
，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/611/2021_2022__E9_A2_88_E9_83_A8_E7_98_A2_E7_c22_611644.htm 颈部烧伤后瘢痕挛缩畸形【诊断】1.原因烧伤。2.临床表现因瘢痕挛缩导致颈部不同程度的畸形。（1）颏颈粘连、下唇颏颈胸粘连等。（2）颏颈角消失或变钝。（3）下唇外翻、口角颊部受牵拉变形。（4）颈部活动受限。（5）可伴小颏、开畸形等。【治疗】治疗目的在于彻底松解瘢痕，补充缺损皮肤，使唇部和颊部组织复位，恢复颈部形态和功能活动。方法有：1.植皮术尽可能采用较厚皮片，成活后应用弹力绷带加压至少3个月，并加强颈部功能锻炼，以减轻皮片收缩。2.皮肤组织扩张器法对颈部健康皮肤或面颊部、胸部邻近皮肤用扩张器进行扩张，形成扩张皮瓣转移至颈部覆盖切除或松解瘢痕形成的创面。3.吻合血管的游离皮瓣移植可选用肩胛皮瓣、股前外侧皮瓣等转移至颈部，皮瓣血管与面动脉和面前静脉进行吻合。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com