

外阴上皮内瘤样病变\_肿瘤科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/611/2021\\_2022\\_\\_E5\\_A4\\_96\\_E9\\_98\\_B4\\_E4\\_B8\\_8A\\_E7\\_c22\\_611750.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/611/2021_2022__E5_A4_96_E9_98_B4_E4_B8_8A_E7_c22_611750.htm) 外阴上皮内瘤变为外阴的癌前病变，包括不同程度的外阴鳞状上皮不典型增生及原位癌，分为三级。1. vin 级:为鳞状上皮细胞轻度不典型增生，即不典型细胞局限于上皮下1/30 2. vin 级:为鳞状上皮细胞中度不典型增生，即不典型细胞局限于上皮下2/303. vin 级:包括鳞状上皮细胞重度不典型增生和原位癌，即不典型细胞几乎达上皮全层或已占据全层上皮，但仍局限于上皮内，基底膜完整。【诊断】1.可有外阴瘙痒或无明显症状。2.外阴病变部位皮肤呈苔藓样、白色或红色、或角化不全斑块，位于黏膜部位病变呈粉红色或棕色斑点状，略高出黏膜表面，病变表面可有破损、渗出及结痂。肉眼不能与良、恶性鉴别。3.本病均为病理诊断。需活检才能确诊。用取多点活检及甲苯胺蓝染色部位取材。【治疗】以手术治疗为主。1. vin 级:可用激光或冷冻治疗，或局部病灶完整切除。2. vin 级:多用局部病灶完整切除。3. vin 级:扩大局部切除术，切缘距病变至少5 mm及外阴修复术。如果病变较广，创面较大，可考虑植皮，以免影响性功能。凡切除的标本均应行冰冻切片，如发现浸润癌，需扩大手术范围。一般老年妇女的ivn适宜行单纯外阴切除术。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)