

阴道良性肿瘤_肿瘤科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/611/2021_2022__E9_98_B4_E9_81_93_E8_89_AF_E6_c22_611754.htm 阴道良性肿瘤包括中肾管、副中肾管囊肿、包涵囊肿等阴道囊肿、乳头状瘤、平滑肌瘤及纤维瘤等。

【诊断】1. 阴道囊肿一般不大，多无症状，于妇科检查时发现。较大囊肿可有阴道阻塞感。中肾管、副中肾管囊肿位于阴道两侧、单房、壁薄。包涵囊肿发生于阴道分娩、手术或损伤后，鳞状上皮被包埋形成囊肿，多位于阴道下端的后壁或侧壁。2. 乳头状瘤为阴道黏膜良性病变，有多数白色乳头状突起，呈小菜花状、质脆、如合并感染，则阴道分泌物增加或出血。3. 平滑肌瘤或纤维瘤好发于阴道前壁、单发或多发，呈黏膜下结节状，小者无症状，较大者有阴道坠胀，性交障碍，合并感染则有坏死、破溃、分泌物增多及出血。4. 诊断多无困难，当有感染、溃烂时须注意与阴道恶性肿瘤鉴别。【治疗】1. 阴道囊肿多不需治疗。如囊肿较大或有症状，可行囊肿剥除术。2. 实性良性肿瘤，应行手术切除肿瘤。并送病理检查，以排除恶性肿瘤。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com