

宫颈乳头状瘤_肿瘤科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/611/2021_2022__E5_AE_AB_E9_A2_88_E4_B9_B3_E5_c22_611758.htm

【概述】宫颈乳头状瘤(cervical papilloma)常见两种。1．与妊娠有关的乳头状瘤，其发生与妊娠黄体及胎盘分泌的雌激素、孕激素特别是雌激素的刺激有关。2．另一种为赘生性乳头状瘤，与妊娠无关，有5%可恶变。前者较后者多见。**【病理】**宫颈乳头状瘤可见从宫颈外口脱出的乳头状赘生物。镜下观棘细胞层增生，整个上皮层增厚呈乳头状，其中心为纤维结缔组织。棘细胞排列整齐有层次，核分裂少见，胞浆内含糖原。**【临床表现】**病人常无症状，多在妇科检查时发现。也可有阴道分泌物增多、不规则少量阴道出血或接触性出血。**【诊断】**确诊及鉴别诊断应靠病理检查。**【治疗措施】**妊娠期发生的乳头状瘤不需治疗，妊娠终止后肿瘤逐渐消退。非妊娠期，经活体组织检查排除宫颈恶性肿瘤后，去除病灶为治疗原则，可用电切术将乳头状瘤根部电凝，也可行电烙、冷冻或激光治疗。确诊及鉴别诊断应靠病理检查。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com