

子宫肉瘤_肿瘤科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/611/2021_2022__E5_AD_90_E5_AE_AB_E8_82_89_E7_c22_611761.htm 原发性子宫肉瘤较少

见，宫颈肉瘤较宫体肉瘤更少见。继发性子宫肉瘤系由子宫肌瘤恶变而来。原发性子宫肉瘤的组织学分类复杂，简要分类为子宫平滑肌肉瘤、子宫内膜间质肉瘤、恶性苗勒管混合瘤（也有称为恶性中胚叶混合瘤或癌肉瘤者）、腺肉瘤及其他肉瘤类（包括横纹肌、骨、软骨、脂肪等异源成分来源的肉瘤和血管、淋巴来源的肉瘤等）。【诊断】1.可发生于任何年龄，多见于绝经前后妇女，宫颈葡萄状肉瘤多见于幼女。2.月经异常或不规则阴道出血或绝经后出血。3.阴道异常分泌物，呈浆液性、血性，如合并感染则呈脓性，有恶臭。4.腹痛，由于肉瘤生长快所致。5.由于子宫肿块，生长迅速，于下腹部可摸到包块。6.可有膀胱或直肠压迫症状。7.妇科检查：子宫不同程度增大，外形不规则，原发肉瘤质地偏软。可见脱出宫颈口外的赘生物，色暗红，继发感染时伴脓性分泌物和坏死组织，晚期子宫肉瘤可呈冰冻样骨盆。8.宫颈口外脱出物活检或诊断性刮宫病理检查有助诊断。9.如原有子宫肌瘤，近期长大快，应高度警惕肉瘤变可能性。当子宫肌瘤行手术时，应注意检查，如有可疑恶性需送冰冻切片病理确诊。10.必要时行胸部/线检查了解有无肺转移。11.分期：为临床分期 期肿瘤局限于子宫体 期肿瘤浸润至子宫颈 期肿瘤浸润子宫外盆腔器官 期肿瘤浸润至腹腔内器官或远处转移。【治疗】以手术为主，辅以放疗或化疗。1.手术： 期：行全子宫及双附件切除术，探查盆腔及腹主动脉

旁淋巴结，如有增大，予以切除。 期（累及子宫颈）：行广泛子宫切除双附件切除及盆腔和腹主动脉旁淋巴清除术。

2. 放疗：多用于手术前、后辅助治疗或晚期、复发病人，以子宫内膜间质肉瘤和恶性苗勒管混合瘤对放疗较平滑肌瘤敏感。

3. 化疗：作为综合治疗措施之一。一般认为子宫平滑肌肉瘤，对化疗较内膜间质肉瘤和恶性苗勒管混合瘤敏感。化疗方案及用法见“妇科恶性肿瘤化疗”章节。

4. 激素类药物治疗：为辅助治疗，主要用于低度恶性内膜间质肉瘤，其雌、孕激素受体多阳性，对孕激素或孕激素加三苯氧胺有较好疗效。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com