

骨瘤_肿瘤科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/611/2021_2022__E9_AA_A8_E7_98_A4__E8_82_BF_c22_611785.htm 骨瘤多发于膜内成骨的骨骼，最多见于颅面骨，称骨旁骨瘤；偶尔也见软组织，则称骨外骨瘤。膜内成骨的骨瘤可随骨骼发育成熟而停止生长，并且无恶变，其预后一般良好。然而，颈椎发生骨瘤极少见。另外，多发性骨瘤如合并肠道息肉病则称garder综合征，此病有遗传性。【治疗措施】若患者无临床症状，可不予处理，但需临床定期随访观察；若患者有临床压迫症状，则需行手术治疗，手术的目的是切除肿瘤组织和稳定脊柱，即肿瘤刮除和植骨融合术。【病理改变】颈椎骨瘤由分化很好的成熟骨组织组成，有明显的骨小梁结构。依其密度不同，骨瘤分成三型，致密型；骨瘤组织呈象牙样改变，质地坚硬，切面近似皮质滑。松质骨型；瘤体呈海绵样改变，可见骨髓组织。混合型；具有上述两者的特点。若按其生长方式，可分为两型：骨瘤生长于颈椎骨表面者称外生骨瘤；若生长在骨髓腔内则称为内生骨瘤或“骨岛”。成人骨瘤若骨小梁周围无骨细胞增生，表明肿瘤已停止生长。【临床表现】颈椎骨瘤患者的临床表现，主要是由于肿瘤本身对周围组织的压迫所致；因此，患者临床症状的轻重同肿瘤的大小、生长速度以及对邻近组织的压迫等因素有关。小的骨瘤一般无症状，常因其他原因拍摄颈椎x线片偶然发现。大的骨瘤，依肿瘤压迫的组织不同，出现相应的压迫症状。【辅助检查】x线片表现：肿瘤若发生于椎体内则呈现均匀致密增白阴影，也是椎体骨瘤的特点。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下

载。详细请访问 www.100test.com