

软骨粘液样纤维瘤_肿瘤科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/611/2021_2022__E8_BD_AF_E9_AA_A8_E7_B2_98_E6_c22_611791.htm 软骨粘液样纤维瘤

为主要由粘液样软骨组成的软骨来源的良性肿瘤。【诊断】1. 流行病学 (1) 年龄 10~30 岁。(2) 性别男多于女。(3) 部位好发于长骨干骺端和跗骨，尤以胫骨近端最多见。2. 临床表现 疼痛为主要症状，少数无症状者可因拍/线片而偶然发现。3. 自然病程 生长缓慢，很少长到很大，边缘有反应骨，多为2期活跃性病变，1期者很少，但可发展为3期侵袭性病变，穿破骺板侵入骨髓和周围软组织。未见恶变为软骨肉瘤的病例。4. x线表现 病变表现为干骺端的边界清楚的、偏心性、低密度阴影，呈“扇贝”样缺损，病灶常呈分叶状，有时可见多个。codman三角罕见，明显的钙化不常见。5. 其他影像学检查 放射性核素扫描、ct, mri。【治疗】手术治疗2期病变行刮除术，复发率小于10%，而3期病变刮除后复发率太高，必须行广泛切除。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com