

临床诊断学 尿氢链测定实践技能考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/617/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_B4\\_E5\\_BA\\_8A\\_E8\\_AF\\_8A\\_E6\\_c22\\_617012.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/617/2021_2022__E4_B8_B4_E5_BA_8A_E8_AF_8A_E6_c22_617012.htm) [项目名称]尿氢链测定 此项实验与尿液本周氏蛋白测定具有相同的诊断价值，用于诊断轻链病。 [参考值]阴性 [临床意义]正常免疫球蛋白是由两条重链和两条轻链结合在一起构成的，在某些病理情况下，这些重链和轻链会增加，可在血清和尿液中检测出来，因此称为重链病或轻链病。检查尿液中的轻链的方法比较简单，因此实际工作中开展较多的是尿轻链（ $\kappa$ 链和 $\lambda$ 链）测定。在多发性骨髓瘤时，尿轻链测定结果为阳性；系统性红斑狼疮和淋巴瘤患者的尿液中尿轻链测定也多为阳性。更多信息请访问：百考试题医师网校 医师论坛 医师在线题库 百考试题执业医师加入收藏 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)