

执业药师考试考点汇总与解析中药综合技能（十三）执业药师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/620/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E8_8D_AF_E5_c23_620265.htm 考点141：常用非处方中成药 - 鼻病类药

1. 鼻炎康片 功能主治：清热解毒，宣肺通窍，消肿止痛。用于急慢性鼻炎，过敏性鼻炎。 2. 鼻通宁滴剂 功能主治：通利鼻窍。用于鼻塞不通。 3. 辛夷鼻炎丸 功能主治：祛风，清热，解毒。用于鼻炎。 4. 鼻窦炎口服液 功能主治：通利鼻窍。用于慢性鼻炎、鼻窦炎引起的鼻塞不通，流黄稠涕。 5. 通窍鼻炎片、胶囊、颗粒 功能主治：益气，祛风，通窍。用于体虚自汗，反复感冒，鼻塞，流涕。 注意事项：外感风热，流清涕的鼻病患者忌用；慢性鼻炎、过敏性鼻炎等病缠绵不愈，或鼻息肉引起的鼻塞头痛应去医院就诊。用药后感觉唇部麻木者，应停药。 考

点142：常用非处方中成药 - 眼病类药 1. 风火眼药 功能主治：清热解毒，退翳明目。用于暴发火眼，翳膜遮睛，沙眼。 2. 小儿明目丸 功能主治：清热明目，散风止痒。用于上焦热盛，两眼红肿，疼痒不安，二便不利。 3. 珍视明滴眼液 功能主治：明目去翳，清热解痉。用于青少年假性近视，缓解视疲劳。 4. 麝珠明目滴眼液 功能主治：消翳明目，用于老年性初、中期白内障。 5. 明目地黄丸、浓缩丸 功能主治：滋肾，养肝，明目。用于肝肾阴虚，目涩畏光，视物模糊，迎风流泪。 6. 明目上清片 功能主治：清热散风，明目止痛。用于暴发火眼。 7. 杞菊地黄丸、浓缩丸、口服液、片、胶囊 功能主治：滋肾养肝。用于肝肾阴亏的眩晕、耳鸣、目涩畏光、视物昏花。 考点143：常用非处方中成药 - 骨伤科用

药 1.骨疏康颗粒 功能主治：补肾益气，活血壮骨。主治肾虚、气血不足所致的中老年骨质疏松症，伴有腰脊酸痛、足膝酸软、神疲乏力。 2.关节止痛膏 功能主治：活血，消炎，镇痛，对局部血管有扩张作用。用于关节扭伤及寒湿引起的关节疼痛。 注意事项：禁止内服。本品含有刺激性药物，忌贴于创伤处；有皮肤病者慎用。皮肤过敏者停用；血虚无瘀者禁用，孕妇禁用。 3.红花油 功能主治：驱风药。用于风湿骨痛，跌打扭伤，外感头痛，皮肤瘙痒。 注意事项：为外用药，禁止内服。皮肤、黏膜破损处禁用；孕妇禁用；皮肤过敏者停用。 4.云南白药酊 功能主治：活血散瘀，消肿止痛。用于跌打损伤，风湿麻木，筋骨及关节疼痛，肌肉酸痛及冻伤。 注意事项：禁止内服。皮肤破伤处不宜使用；孕妇禁用。乙醇过敏者禁用；皮肤过敏者停用；用药后1日内，忌食蚕豆、鱼类、酸冷食物。 5.云南白药气雾剂 功能主治：活血散瘀，消肿止痛。用于跌打损伤，瘀血肿痛，肌肉酸痛及风湿疼痛。 用法用量：凡遇较重闭合性跌打损伤者，先喷云南白药气雾剂保险液，若剧烈疼痛仍不缓解，可间隔1~2分钟重复给药，一天使用不得超过3次。喷云南白药气雾剂保险液间隔3分钟后，再喷云南白药气雾剂。 注意事项：皮肤受损者勿用；孕妇禁用；皮肤过敏者停用；使用时勿近明火，切勿受热，应置于阴凉处保存。 6.颈痛灵药酒 功能主治：滋补肝肾，活络止痛。用于各种颈椎病引起的疼痛。 注意事项：孕妇忌服；乙醇过敏者禁用；服用本品时不宜同时服藜芦、五灵脂、皂荚或其制剂；不宜喝茶和吃白萝卜。 7.妙济丸 功能主治：强筋壮骨，祛湿通络，活血止痛。用于四肢麻木拘挛，骨节疼痛，腰腿酸软。 8.颈复康颗粒 功能主治：活血通络

，散风止痛。用于颈椎病引起的头晕、肩背酸痛、手臂麻木。

9.风痛灵 功能主治：活血散瘀，消肿止痛。用于扭挫伤痛，风湿痹痛，冻疮红肿。 注意事项：为外用药，不可内服。瓶盖宜拧紧，防止药物挥发；孕妇禁用。3岁以下儿童慎用；使用时皮肤出现皮疹、瘙痒应停用；症状1周内无明显改善，或有加重趋势者，应去医院就诊。

10.跌打活血散 功能主治：舒筋活血，散瘀止痛。用于跌打损伤，闪腰岔气。 注意事项：按照用法用量服用，内服时对饮酒不适者可用温开水送服。皮肤破伤处不宜外敷；孕妇禁用。儿童慎用；肝肾功能异常者禁内服。

11.活血止痛散、胶囊 功能主治：活血散瘀，消肿止痛。用于跌打损伤，瘀血肿痛。 注意事项：按照用法用量服用，饮酒不适者可用温开水送服；孕妇及6岁以下儿童禁用，肝肾功能异常者禁用。

12.三七胶囊 功能主治：散瘀止血，消肿定痛。用于外伤出血，跌扑肿痛。 注意事项：孕妇禁用。儿童慎用；肝肾功能异常者禁用。

13.养血荣筋丸 功能主治：养血荣筋，祛风通络。用于跌打损伤日久引起的筋骨疼痛、肢体麻木等陈旧性疾患。

14.跌打损伤丸 功能主治：行气活血，舒筋止痛。用于跌打损伤，筋骨疼痛。 注意事项：孕妇忌服。儿童慎用；月经期停药。

15.克伤痛搽剂、气雾剂 功能主治：活血化瘀，消肿止痛。用于急性软组织扭挫伤。 注意事项：为外用药，忌入口、眼及皮肤破损处。小儿皮肤娇嫩，慎用；孕妇及乙醇过敏者忌用；使用时皮肤出现皮疹、瘙痒者应停用。

16.风湿痛药酒 功能主治：祛风除湿，活络止痛。用于风湿骨痛，手足麻木。 注意事项：孕妇忌服。儿童以及乙醇过敏者禁用；高血压、糖尿病及肝病患者慎用。

17.活络止痛丸 功能主治：活血舒筋，驱风除湿。用于风湿痹痛

，手足麻木酸软。 18.木瓜酒 功能主治：祛风活血。用于风湿痹痛，筋脉拘挛，四肢麻木，关节不利。 注意事项：儿童以及乙醇过敏者禁用；孕妇以及高血压、糖尿病及肾功能异常者慎服。 19.伤湿止痛膏 功能主治：祛风湿，活血止痛。用于风湿痛，关节、肌肉痛，扭伤。 20.史国公药酒 功能主治：祛风除湿，活血通络。用于风寒湿痹，骨节疼痛，四肢麻木。 注意事项：高血压、糖尿病及热证患者忌服；儿童以及乙醇过敏者禁用；孕妇慎用

考点144：中药不良反应的病因学分类

1.与药物剂量有关的中药不良反应及药源性疾病，该类型由药物本身或其代谢物所引起，使固有药理作用持续和增强。 2.与药物剂量无关的中药不良反应及药源性疾病，该类型与药物固有的正常药理作用无关，而与药物变性和人体特异体质有关。 药物变性，指药物有效成分降解产生有害物质。 特异体质，指病人的特殊遗传素质，如红细胞6-磷酸葡萄糖脱氢酶缺乏等。 此类伤害又可分为两种：（1）特异质反应，指由于遗传性因素人体产生的不良反应。（2）变态反应，亦称药物过敏反应。 3.与中药配伍有关的中药不良反应及药源性疾病，常由发生配伍禁忌及中医药配伍发生相互作用等引起。 4.药物依赖性。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。 详细请访问 www.100test.com