

脑血栓有哪些临床表现?临床执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/641/2021\\_2022\\_\\_E8\\_84\\_91\\_E8\\_A1\\_80\\_E6\\_A0\\_93\\_E6\\_c22\\_641882.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/641/2021_2022__E8_84_91_E8_A1_80_E6_A0_93_E6_c22_641882.htm)

脑血栓形成又称动脉血栓性脑梗死，是由于脑动脉硬化形成动脉壁病变导致管腔内血栓形成，引起动脉供血区局部脑组织缺血，缺氧而坏死，引起局限性神经功能障碍。多发生于50岁以后，常在安静，睡眠中发病，部分患者有前驱症状，如头痛，眩晕、偏身麻木无力、等。起病缓慢，多无意识障碍。有时亦可急骤起病。由于于形成血栓的部位不同，临床表现也各不相同。

(1) 颈内动脉系统脑血栓：主要表现为“三偏症”：病变对侧偏瘫、偏身感觉障碍和偏盲，若主侧半球病变可伴失语症。

(2) 大脑中动脉脑血栓：可出现对侧偏瘫和感觉障碍，特点是面及上肢比下肢重，可有同向性偏盲。

(3) 大脑前动脉脑血栓：表现为对侧肢体瘫痪和感觉减退，特点是上肢轻，下肢重。可有排尿障碍和精神症状。CT检查通常在起病48小时后才能确诊。

(4) 椎-基底动脉系统硬化性脑梗死：多表现为眩晕、耳鸣，眼震，复视，吞咽困难，共济失调、交叉性瘫痪或感觉障碍，若桥脑基底部病变，病人意识尚存，但由于四肢瘫痪和延髓麻痹，只能靠眼球上下运动表达自己的意识活动，称为闭锁综合征。更多信息请访问：百考试题医师网校 医师论坛 医师在线题库 百考试题执业医师加入收藏 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)