

闭塞性周围动脉粥样硬化病常见症状临床执业医师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/641/2021_2022__E9_97_AD_E5_A1_9E_E6_80_A7_E5_c22_641890.htm 根据病情进展大致可

分以下四期：
 轻微不适期：病人可有患肢发凉、麻木或感觉异常，活动后易感疲乏，有时足癣等感染不易治愈。
 间歇性跛行期：此为最常见的早期症状，表现为典型的病侧下肢"行走-疼痛-休息-缓解"的重复规律。疼痛部位有助于判断动脉阻塞的水平，小腿疼痛常常示浅表股动脉阻塞；大腿和小腿均痛常示髂股动脉阻塞；髋部和臀部疼痛常示主髂动脉阻塞。上肢病变者可出现间歇性乏力、感觉缺失等。
 静息性肢痛期：此时常提示动脉严重阻塞，肢痛以夜间为著，与卧位时失去重力性血流灌注有关，如将患肢下垂可减轻疼痛。至病程晚期出现患肢持续性剧痛，即使下垂肢体也不能缓解，继之出现坏死性病变。
 组织坏死期：患肢远端出现缺血性溃疡和坏疽，渐向上扩展（但很少超过膝关节），甚至并发局部蜂窝组织炎、骨髓炎或败血症。更多信息请访问：
百考试题医师网校 医师论坛 医师在线题库 百考试题执业医师
加入收藏 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com