

长期尿失禁的实验室检查临床执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022__E9_95_BF_E6_9C_9F_E5_B0_BF_E5_c22_644815.htm 实验室检查 应检查尿液分析以及尿素氮和肌酐水平。分不清的病人应测定电解质，有排尿困难时应作尿培养，如排尿记录表明多尿应测定血清葡萄糖和钙的浓度（在患病，营养不良的病人要测定白蛋白以便于计算游离钙水平）。无菌的血尿，耻骨上或会阴部不适，或膀胱癌的高危病人（如新近发生的无法解释的尿急或冲动性尿失禁，与工业染料接触）均应进行尿细胞学或膀胱镜检查。如果引起尿失禁的原因不能确定，应考虑尿流动力学检查。尽管其真正作用尚有争议，但当诊断不确定可影响治疗，当经验性治疗失败想尝试其他方法，或是当打算进行手术时，仍有理由进行多道的尿流动力学试验。更多信息请访问：百考试题医师网校 医师论坛 医师在线题库 百考试题执业医师加入收藏 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com