

2009年公卫医师辅导：霍乱治疗原则公卫执业医师考试 PDF  
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/644/2021\\_2022\\_2009\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_85\\_AC\\_c22\\_644865.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E5_85_AC_c22_644865.htm)

霍乱治疗原则：（一）按甲类传染病隔离治疗。危重病人应先就地抢救，待病情稳定后在医护人员陪同下送往指定的隔离病房。确诊与疑似病例应分开隔离。（二）轻度脱水病人，以口服补液为主。（三）中、重型脱水病人，须立即进行静脉输液抢救，待病情稳定、脱水程度减轻、呕吐停止后改为口服补液。（四）在液体治疗的同时，给予抗菌药物治疗以减少腹泻量和缩短排菌期。可根据药品来源及引起流行的霍乱弧菌对抗菌药物的敏感性，选定一种常用抗菌药物，至粪便培养检查转阴。更多信息请访问：百考试题医师网校 医师论坛 医师在线题库 百考试题 执业医师技能加入收藏相关推荐：2009年公卫医师辅导：霍乱控制措施 2009年公卫医师辅导：霍乱的概述 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)