

2010年执业中药师中药剂学：液体药剂的质量检查执业药师  
考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/644/2021\\_2022\\_2010\\_E5\\_B9\\_B4\\_E6\\_89\\_A7\\_c23\\_644729.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E6_89_A7_c23_644729.htm) id="wang" class="chao">

**【重量差异】**除另有规定外，单剂量的干混悬剂应检查重量差异。检查法取供试品20个/袋、分别称量内容物，计算平均重量，超过平均重量 $\pm 10\%$ 者不得过2个，并不得有超过平均重量 $\pm 20\%$ 者。凡规定检查含量均匀度者，不再进行重量差异检查。

**【装量】**除另有规定外，单剂量口服溶液剂、口服混悬剂、口服乳剂装量，应符合下列规定。取供试品10个（袋、支），分别将内容物倾尽，测定其装量，每个（袋、支）装量均不得少于其标示量。多剂量口服溶液剂、口服混悬剂、口服乳剂照“最低装量检查法”（附录 F）检查，应符合规定。百考试题 - 全国最大教育类网站([www.Examda.com](http://www.Examda.com))

**【干燥失重】**除另有规定外，干混悬剂照“干燥失重测定法”（附录 L）检查，减失重量不得过2.0%。

**【沉降体积比】**口服混悬剂，沉降体积比应不低于0.90。干混悬剂按各品种项下规定的比例加水振摇，应均匀分散，并照上法检查沉降体积比，应符合规定。采集者退散

**【微生物限度】**照“微生物限度检查法”（附录 J）检查，应符合规定。

更多信息请访问：[执业药师网校](#) [百考试题论坛](#) [百考试题在线考试系统](#) [百考试题执业药师加入收藏](#) 相关推荐：2010年执业中药师中药剂学：远志酊 2010年执业中药师中药剂学：常用稳定剂 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)