

2009年中药师中药剂学：宝儿康散执业药师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_644908.htm id="deng" class="kuang"> 拼音名

：BaoerkangSan 标准编号：WS3-B-1966-95 「处方」太子参 550g 芡实410g 薏苡仁410g 茯苓480g 白扁豆（炒）410g 甘草（炙）130g 白术（炒）280g 麦芽（炒）350g 山楂 350g 北沙参 410g 山药 200g 陈皮200g 石菖蒲 200g 莲子 410g 「制法」以上十四味，山药、芡实粉碎成细粉，过筛，取约550g细粉备用；剩余约60g与其余太子参等十二味加水煎煮二次，第一次2小时，第二次1.5小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩成稠膏状，加入上述细粉，混匀，干燥，粉碎成细粉，过筛，制成1000g，即得。「性状」本品为褐棕色的粉末；气微，味酸、甘。本文来源:百考试题网 「鉴别」（1）取本品，置显微镜下观察：淀粉粒多为复粒，多数由百余粒组成，类球形，直径13~35 μm.草酸钙针晶束存在于粘液细胞中或散在，多碎断，长80~240 μm，针晶粗2~5 μm。（2）取本品3g，加乙醇20ml，加热回流10分钟，滤过，滤液蒸干，加水10ml，用氢氧化钠试液调pH值至10~11，搅拌，置分液漏斗中，加氯仿15ml，振摇，分取氯仿液，蒸干，残渣加5%硫酸溶液4ml，温热使溶解，分置三支试管中。一管加碘化铋钾试液1~2滴，生成桔红色沉淀；一管加碘化汞钾试液1~2滴，生成白色沉淀；另一管加硅钨酸试液1~2滴，生成白色沉淀。「检查」应符合散剂项下有关的各项规定（附录10页）。来源：www.100test.com 「功能与主治」补气健脾，开胃消食，渗湿，止泻。用于小儿脾胃虚弱，消化不良，食欲不振，

大便异常，精神困倦，睡眠不安，夜惊、夜啼等症。「用法与用量」开水冲服，周岁小儿一次0.25g，二岁至三岁一次0.5g，四岁至六岁一次1g，一日2次。「规格」每瓶装1g。

来源：考试大的美女编辑们「贮藏」密封。更多信息请访问：[执业药师网校](#) [百考试题论坛](#) [百考试题在线考试系统](#) [百考试题执业药师加入收藏相关推荐](#)：2009年中药师中药剂学：100test乐 2009年中药师中药剂学：100test牛黄散（牛黄小儿散）100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com