

2009年中药师中药剂学：宝咳宁颗粒（冲剂）执业药师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_644909.htm id="deng" class="kuang"> 拼音名

：BaokeningKeli 标准编号：WS3-B-0572-91采集者退散「处方」紫苏叶 30g 桑叶30g 前胡60g 浙贝母30g 麻黄30g 桔梗30g 天南星（炙）60g 陈皮30g 苦杏仁（去皮炒）60g 黄芩60g 青黛21g 天花粉60g 枳壳（去瓢麸炒）60g 山楂（炒）45g 甘草15g 牛黄3g 「制法」以上十六味，除牛黄外，取紫苏叶、陈皮提取挥发渍，蒸馏后的水溶液另器收集；其余桑叶等十三味加水煎煮二次，第一次2.5小时，第二次1.5小时，合并煎液，滤过，滤液与上述水溶液合并，浓缩至相对密度为1.32~1.35（50℃）的清膏。取清膏1份，蔗糖3.75份，糊精1.25份与牛黄粉配研均匀，制成颗粒，干燥，加入上述紫苏叶等挥发油，混匀，即得。「性状」本品为灰绿色的颗粒；味甜、微苦。百考试题 - 全国最大教育类网站(www.Examda.com)「鉴别」（1）取本品2g，研细，加乙醚10ml，浸渍1小时，滤过，滤液置蒸发皿中，挥去乙醚，残渣加5%香草醛硫酸溶液2~3滴，显紫色。（2）取本品3g，加甲醇10ml，置水浴上加热回流提取15分钟，放冷，活性炭脱色，滤过，加镁粉少量与盐酸1ml，溶液渐显棕红色。来源

：www.examda.com（3）取本品10g，研细，置50ml锥形瓶中，加乙醚30ml，浓氨试液1ml，密塞，放置2小时，时时振摇，滤过，加酸性乙醇（取乙醇20ml，加盐酸1ml混匀）1ml，蒸干，残渣加甲醇0.5ml使溶解，作为供试品溶液。另取盐酸麻黄碱对照品，加甲醇制成每1ml含5mg的溶液，作为对照品

溶液。照薄层色谱法（附录 B）试验，吸取上述两种供试品溶液各10 μl，对照品溶液2 μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以氯仿 - 甲醇 - 浓氨溶液（20：3.5：0.5）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以茚三酮试液，在105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。「检查」应符合冲剂项下有关的各项规定（附录 C）。「功能与主治」清热解表，止嗽化痰。用于小儿感冒风寒内热停食引起的头痛身烧，咳嗽痰盛，气促作喘，咽喉肿痛，烦躁不安。「用法与用量」开水冲服，一次2.5g，一日2次。周岁以内小儿酌减。「规格」每袋装5g来源：www.examda.com「贮藏」密闭，防潮。更多信息请访问：[执业药师网校](#) [百考试题论坛](#) [百考试题在线考试系统](#) [百考试题](#) [执业药师加入收藏相关推荐](#)：2009年中药师中药剂学：100test牛黄散（牛黄小儿散）2009年中药师中药剂学：100test乐 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com