2009年中药师中药剂学:独圣活血片执业药师考试 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022_2009_E5_B9_ B4_E4_B8_AD_c23_644923.htm id="zhongxiao" class="shan"> 拼 音名:DuShengHuoxuePian 标准编号:WS3-B-3631-98「 处方」三七香附当归延胡索(醋炙)鸡血藤大黄甘草「制 法」以上七味,三七及部分香附分别粉碎成细粉,过筛;当 归提取挥发油,蒸馏后的水溶液另器收集;药渣与剩余的香 附及鸡血藤、大黄、甘草加水煎煮三次,第一次3小时,第二 次2小时,第三次1小时,合并煎液,滤过,滤液浓缩至适量 ;延胡索粉碎成粗粉,用三倍量的60%乙醇浸泡24小时,加 热回流提取2小时,收集提取液,再加二倍量的60%乙醇加热 回流提取2小时,收集提取液,与上述提取液合并,滤过,滤 液回收乙醇,与上述浓缩液合并,继续浓缩成稠膏状,加入 三七、香附细粉,混匀,制成颗粒,干燥,放冷,喷加当归 挥发油,混匀,压制成片,包糖衣,即得。「性状」本品为 糖衣片,除去糖衣后显棕褐色;味苦、辛。 百考试题论坛「 鉴别」(1)取本品,置显微镜下观察:石细胞类方形、类 圆形或类多角形,壁较厚。分泌细胞呈类圆形或矩圆形,胞 腔内含淡黄棕色或红棕色分泌物。(2)取本品4片,除去糖 衣,研细,加乙醚20ml,浸渍过夜,弃去乙醚液,残渣挥尽 乙醚,加甲醇20ml,加热回流1小时,滤过,滤液蒸干,残渣 加水10ml使溶解,用水饱和的正丁醇提取2次,每次20ml,合 并正丁醇液,加氨试液3倍量,摇匀,放置使分层,取正丁醇 层,蒸干,残渣加甲醇1ml使溶解,作为供试品溶液。另取人 参皂甙Rb1、Rg1及三七皂甙R1对照品,加甲醇制成每1ml各

含2.5 mg的混合溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(附录 B)试验,吸取供试品溶液10 µI,对照品溶液2 µI,分别点 于同一硅胶G薄层板上,以氯仿-甲醇-水(13:7:2)的下 层溶液为展开剂,展开,取出,晾干,喷以10%的硫酸溶液 ,于105 烘约10分钟。供试品色谱中,在与对照品色谱相应 的位置上,显相同颜色的斑点,置紫外光灯(365nm)下检 视,显相同的荧光斑点。采集者退散(3)取本品6片,除去 糖衣,研细,加浓氨溶液1ml,放置1分钟,加乙醚20ml,浸 渍1小时,时时振摇,滤过,滤液蒸干,残渣加氯仿1ml使溶 解,作为供试品溶液。另取延胡索乙素对照品,加氯仿制成 每1ml含1mg的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(附录 B)试验,吸取上述供试品溶液10 µI,对照品溶液5 µI,分 别点于同一硅胶G薄层板上,以乙醚-环己烷-氯仿(5:3 : 0.5) 为展开剂,展开,取出,晾干,置碘蒸气中熏至斑点 清晰。日光下检视,供试品色谱中,在与对照品色谱相应的 位置上,显相同颜色的斑点;挥尽碘后,置紫外光灯 (365nm)下检视,供试品色谱中,在与对照品色谱相应的 位置上,显相同颜色的荧光斑点。(4)取本品2片,除去糖 衣,研细,加甲醇10ml,室温浸渍2小时,时时振摇,滤过, 滤液蒸干,加水10ml使溶解,再加盐酸1ml,置水浴上加热30 分钟,立即冷却,用乙醚提取2次,每次20ml,合并乙醚液, 蒸干,残渣加氯仿1ml使溶解,作为供试品溶液。另取大黄对 照药材0.1g,加甲醇20ml浸渍1小时,滤过,取滤液5ml,蒸干 ,加水10ml,同上法制成对照药材溶液。再取大黄素对照品 ,加甲醇制成每1ml含1mg的溶液,作为对照品溶液。照薄层 色谱法(附录 B)试验,吸取供试品溶液10 µ I,对照药材

溶液及对照品溶液各4 µ I ,分别点于同一硅胶H薄层板上,以石油醚(30~60) - 甲酸乙酯 - 甲酸(15:5:1)的上层溶液为展开剂,展开,取出,晾干,置氨气中熏后,日光下检视。供试品色谱中,在与对照药材色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点,在与对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点。「检查」应符合片剂项下有关的各项规定(附录A)。采集者退散「功能与主治」活血化瘀,消肿止痛,理气解郁。用于跌打损伤,瘀血肿胀及气滞血瘀所致的痛经等症。「用法与用量」口服,一次3片,一日3次。「注意」孕妇慎服。来源:www.examda.com「规格」每素片重0.4g「贮藏」密封。更多信息请访问:执业药师网校百考试题论坛百考试题在线考试系统百考试题执业药师加入收藏相关推荐:2009年中药师中药剂学:独角莲膏2009年中药师中药剂学:独角膏100Test下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com