

浓缩胆汁综合征的临床表现临床执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_\\_E6\\_B5\\_93\\_E7\\_BC\\_A9\\_E8\\_83\\_86\\_E6\\_c22\\_645083.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E6_B5_93_E7_BC_A9_E8_83_86_E6_c22_645083.htm) 浓缩胆汁综合征又称先天性免疫性溶血性肝炎

( Congenital-Immunological Hemolytic Hepatitis ) ，胆栓综合征 ( Bile-Plug Syndrome ) 胆汁浓综合征 ( Coneentrated Bile Syndrome ) 。系指新生儿溶血病后，出现明显的梗阻性黄疸。 1.黄疸在出生后数小时至48小时内出现。 2.黄疸持续3周以上。 3.血清胆红素增高，并具有梗阻性黄疸的特征。 4.絮浊试验阴性。 5.母婴血型不合，新生儿有溶血性疾病的临床表现。 更多信息请访问：百考试题医师网校 医师论坛 医师在线题库 百考试题执业医师加入收藏 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)