

神经外科头皮损伤头皮撕脱伤汇总临床执业医师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E7_A5_9E_E7_BB_8F_E5_A4_96_E7_c22_645130.htm 多因辫子卷入转动的机器中，使大块头皮自帽状腱膜下层或连同颅骨骨膜被撕脱所致。伤者常因大量失血和伤口疼痛发生休克。治疗：首先给镇痛剂，用无菌敷料覆盖创面，加压包扎止血；并将撕脱的头皮用无菌布巾包好，随伤者速送医院处理。争取在12小时内清创。条件良好者，可行小血管吻合，将撕下的头皮缝回；次则将撕下的头皮的皮下层切除，作成全厚或中厚皮片植回；或利用大网膜暂时覆盖创面，待肉芽组织生成后植皮。如受伤已久，感染明显或植皮失败，则按一般感染创面治疗，以后可在颅骨外板外露区，每隔1cm作深达板障的钻孔，或将外板凿除，待肉芽组织生成后植皮。更多信息请访问：[百考试题医师网校](#) [医师论坛](#) [医师在线题库](#) [百考试题执业医师加入收藏](#) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com