

婴幼儿支气管炎治疗措施中医助理执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E5_A9_B4_E5_B9_BC_E5_84_BF_E6_c22_645575.htm

1.一般治疗 关于休息、饮食室内温度、湿度的调整等，详见“上呼吸道感染”。婴儿须经常调换卧位，使呼吸道分泌物易于排出。因咳嗽频繁妨碍休息时，可给镇咳药，但应避免给药过量以致抑制分泌物的咳出。当急性支气管炎发生痉挛而致呼吸困难时，轻者参考以下中医疗法“实热喘”处理，重者参考毛细支气管炎及支气管哮喘的治疗处理。

2.中医疗法 本病中医称为外感咳嗽，由于致病因素不同，临床分为风寒咳嗽、风热咳嗽和实热喘。治法以疏风散寒、清热宣肺、降热平喘为主。可结合临床辨证施治。

(1) 风寒咳嗽：以突然咳嗽，声咳急频为主，痰稀薄、鼻塞、流清涕、咽痒或伴头痛、恶寒或不发热、苔微白，脉浮。治以辛温解表，散寒止咳。常用杏苏散加减。处方举例：杏仁6g，苏叶3g，前胡9g，半夏6g，牛蒡子6g，生姜3片。

(2) 风热咳嗽：咳嗽不爽，痰以黄粘稠为主，咽红口干，鼻塞流黄涕，或伴发热有汗，舌苔身热，大便秘结，脉浮数。治以辛凉解表，宣肺止咳。常用桑菊饮加减。

(3) 实热喘：除上述症状外，患儿发热较高，同时伴有顺喘憋。治以宣肺化痰，降逆平喘。常用麻杏石甘汤加减。处方举例：麻黄3g，杏仁6g，生石膏15g，甘草3g，青黛3g，苏子6g，莱菔子9g，可随症选加其它药物1~2味：表邪重时加菊花9g，鲜芦根15g。热重时加黄芩6g，银花9g，连翘9g。咳嗽重时加前胡9g或百部9g。喘重时选加郁金6g，银杏9g或生赭石15g。痰多时加葶苈子9g，薤仁9g。

3.其

它治疗有时需用适量的吐根糖浆，婴幼儿每次2~15滴，年长儿每次1~2ml，每日4~6次，可使痰液易于咳出。10%氯化铵溶液也有同样作用，其剂量为每次0.1~0.2ml/kg.并发细菌感染时，可选用适当抗菌药物。此外对迁延性支气管炎可加用超短波或紫外线照射。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com