

胰腺囊肿应该如何治疗临床执业医师考试 PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E8_83_B0_E8_85_BA_E5_9B_8A_E8_c22_645612.htm 假性囊肿为外伤，急性胰腺炎的合并症，其形成过程，一般平均6周，其处理分两类。1.急症手术 囊肿破裂、出血、继发感染等危及生命时，行急症外引流（切开引流或囊袋缝合术），注意补充水、电解质及全身治疗。待瘻管形成后再次手术。2.择期手术 假性囊肿形成后2~4月，根据病变程度、范围选定手术。居于胰尾部者，试大收集整理可行胰尾脾脏切除术；位于胰头、体部行囊肿胃吻合术、囊肿十二指肠吻合术、囊肿空肠Roux-Y吻合术。吻合口应足够大，防止逆流感染。内瘻存在时，术前应清洁肠道，口服新霉素1g，4次/日和甲硝唑0.2g，3次/日。同时肌注维生素K。真性囊肿一般与周围组织粘着不紧，较易剥离，也可连同囊肿切除部分胰腺。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com