

临床助理医师 糖皮质激素的副作用临床助理执业医师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E4_B8_B4_E5_BA_8A_E5_8A_A9_E7_c22_645658.htm

无论口服、外用，还是局部注射，糖皮质激素都会产生相应的副作用。长时间口服糖皮质激素可引起或加重高血压、消化性溃疡出血或穿孔、骨质疏松、股骨头坏死、库欣综合征、精神障碍、月经紊乱、肾上腺皮质功能抑制及水、电解质功能紊乱等。因此，口服糖皮质激素治疗白癜风应注意如下禁忌证：高血压、糖尿病、消化性溃疡、结核病以及病毒、细菌、真菌等引起的感染重症，严重的骨质疏松，严重的精神病和癫痫等。长期外用糖皮质激素可造成局部痤疮样皮疹、毛囊炎、毛细血管扩张甚至考试，大网站收集皮肤萎缩等副作用，间歇用药或与其他类外用药轮流应用可减少副作用的发生。局部注射疗法最易导致皮损局部萎缩，而且不良反应的大小与注射激素量及医师的操作技术有很大的关系，目前使用较少。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com