

四种基本抽样方法公卫执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_\\_E5\\_9B\\_9B\\_E7\\_A7\\_8D\\_E5\\_9F\\_BA\\_E6\\_c22\\_645756.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E5_9B_9B_E7_A7_8D_E5_9F_BA_E6_c22_645756.htm) 四种基本抽样方法

：（一）单纯随机抽样 将调查总体的全部观察单位编号，再用随机数字表或抽签等方法随机抽取部分观察单位组成样本。（二）系统抽样 系统抽样又称等间距抽样或机械抽样，即先将总体的全部观察单位按某一顺序号分成 $n$ 个部分，再从第一部分随机抽第 $k$ 号观察单位，依次用相等间隔机械地从每一部分各抽一个观察单位组成样本。（三）整群抽样 整群抽样是先将总体划分为 $K$ 个“群”组（如 $K$ 个地区等），每个群包括若干观察单位；再随机抽取 $k$ 个“群”，并将被抽取的各个群的全部观察单位组成样本。（四）分层抽样 分层抽样即先按观察值影响变异较大的某种特征（如不同的年龄段、病情的轻重、不同经济收入状况等），将总体分为若考试，大网站收集干类型或组别（统计上叫“层”），再从每一层内随机抽取一定数量的观察单位，合起来组成样本。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)