

复习指导：软下疳的概念临床执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E5_A4_8D_E4_B9_A0_E6_8C_87_E5_c22_645807.htm 软下疳，是由杜克雷嗜血杆菌引起的一种性传播疾病。男性感染后，可在阴茎的龟头、冠状沟、包皮内板、包皮系带等处出现炎症性红斑或丘疹，之后可变成水疱或脓疱，破溃后形成糜烂和溃疡。女性感染后，可在大阴唇、小阴唇、阴蒂、尿道口和会阴部发生病损，其病状和男性相同。除了生殖器病变外，还可发生多处病变，如口唇、手指等处。软下疳的病原体侵入人体后，一般经过2 - 7天的潜伏期后开始发病。本病为性交传染，男性较多，女性症状比较轻，或成为带菌者，虽然不发病，但可传染给别人，是最危险的传染源。除了性交可传染以外，也可因接触病人的伤口而感染，有些女患者的伤口虽然愈合，但仍是带菌者，患者和健康人认为已痊愈，结果增加了传染的机会。杜克雷氏嗜血杆菌的特性考试，大网站收集是喜欢在新鲜的人体血液里生长，所以称为“嗜血”。它和大多数病菌一样，耐寒怕热，开水烫、化学药物消毒，均可把它杀死。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com