

乏特氏 ( Vater ) 壶腹周围癌的概述中医执业医师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B9\\_8F\\_E7\\_89\\_B9\\_E6\\_B0\\_8F\\_EF\\_c22\\_645892.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E4_B9_8F_E7_89_B9_E6_B0_8F_EF_c22_645892.htm)

乏特氏壶腹周围癌，系指乏特氏壶腹、胆总管下端、胰管开口处、十二指肠乳头及其附近的十二指肠粘膜等处的癌肿。这些来源不同的肿瘤，由于其所在的特殊解剖部位，有着相同的临床表现，手术时也难以将其截然分开，故常作为一个类型，统称为壶腹周围癌。以往曾习惯将胰头癌考，试大收集整理亦包括在内，然而实际上两者在病程、手术切除率、预后等均有明显不同，前者发展缓慢，黄疸出现早，手术切除率60%左右，五年治愈率达40~45%，而胰头癌发展快，迅速出现胰腺和周围淋巴结转移，黄疸出现晚，手术切除率20%左右，五年治愈仅10%，故现在已将这两种肿瘤分别专题讨论。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)