

乏特氏 (Vater) 壶腹周围癌的鉴别诊断中医执业医师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E4_B9_8F_

[E7_89_B9_E6_B0_8F_EF_c22_645895.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E4_B9_8F_E7_89_B9_E6_B0_8F_EF_c22_645895.htm) 由于本病有上腹闷胀不适，黄疸，有时并发胆道感染、血清淀粉酶升高，可误诊为胆管结石，但根据反复发作史，夏科氏三联征、波动性黄疸，影像学检查可加以区别。甚至误为传染性肝炎，根据壶腹癌AKP升高。转氨酶与血清胆红素发展不平行可资鉴别。

也有误为胆管癌，肝癌的，可根据影像学胆管癌，大收集整理管癌之胆管呈偏心性狭窄，肝癌AFP升高与本病区别。有时易与胰头癌相混淆，但腹痛重于本病，B超、CT等见胰腺内肿块。临床上可进行B超、PTC、ERCP等检查，结合症状、体征便可诊断本病，并鉴别其余易误诊的有关疾病。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com