

2009年口腔颌面外科学综合测试卷三及答案口腔执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_2009\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_8F\\_A3\\_c22\\_645963.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E5_8F_A3_c22_645963.htm)

一、名词解释：（每题4分，请翻译成中文后解释）

1. impacted tooth：阻生牙（1分）是指由于各种原因导致只能部分萌出或完全不能萌出的牙（2分）。多见于下颌第三磨牙（1分）

2. intermaxillary contracture：颌间挛缩（关节外强直）（1）关节外上下颌间皮肤、粘膜和或深层次组织的斑痕导致的张口受限（3分）。

3. masseteric space：咬肌间隙（1分）：位于咬肌与下颌骨外侧考试，大收集整理骨壁之间。由于咬肌在下颌骨下份附丽紧，故潜在间隙位于下颌升支上段外侧。（3分）

二、填空：（共55分）（除特殊注明外，每空1分）

1. 口腔颌面外科学\_\_\_\_\_（英文）的临床实践在我国古代即有记载。有文字记载的最早的唇裂修补术见于我国\_\_\_\_\_朝史书。【答案】Oral and maxillofacial surgery；西晋

2. 口腔颌面外科常用的局麻方法有\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。【答案】表面麻醉；浸润麻醉；阻滞麻醉；冷冻麻醉

3. 在局麻药物中加入血管收缩剂有以下作用：\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。临床上在局麻药中加入肾上腺素的常用浓度为：\_\_\_\_\_。【答案】延缓吸收；减轻毒副作用；延长麻醉时间；减少出血；1：200，000～1：500，000

4. 上颌第一磨牙拔除时需要麻醉的神经有：\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。下颌尖牙拔除时需要麻醉的神经有：\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。【答案】上齿槽后神经；上齿槽中神经；腭大神经（3分）；下牙槽神经；舌神经（2分）

5. 牙挺的工作原理包括\_\_\_\_\_原理、\_\_\_\_\_原理和\_\_\_\_\_原理，在使用牙挺时绝

对不能以\_\_\_\_\_作为支点。【答案】杠杆；轮轴；楔的6.可区分左右侧不同设计的牙钳是\_\_\_\_\_钳；下颌牛角钳使用时除摇动力外，还同时具有\_\_\_\_\_作用，可使牙向牙合向脱位。【答案】上颌第一、二磨牙；楔的7.人工种植牙技术的发展为牙列修复提供了全新的选择，一般种植体可按形状分为：\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。种植体植入后与骨组织之间的界面有两种：\_\_\_\_\_结合和\_\_\_\_\_结合。【答案】骨内种植体；骨膜下种植体；牙内骨内种植体；粘膜内种植体；骨；纤维-骨8.口腔颌面部感染的主要来源有\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。【答案】牙源性；腺源性；损伤性；血源性；医源性9.颌周间隙的感染常常引起严重的张口受限，这些间隙有：\_\_\_\_\_间隙、\_\_\_\_\_间隙、\_\_\_\_\_间隙、\_\_\_\_\_间隙。【答案】咬肌；翼下颌；颞下；颞10.影响下颌骨骨折段移位的因素有：\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_以及\_\_\_\_\_。【答案】骨折部位；外力大小和方向；骨折线方向和倾斜度；骨折段上肌肉附丽情况；骨折线上是否有牙11.骨折的愈合可分为四个阶段：\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。【答案】血肿形成；血肿机化；骨痂形成；骨痂改建12.下颌骨右髁状突颈骨折临床表现为前牙\_\_\_\_\_牙合，下颌骨及下颌牙中线偏向\_\_\_\_\_侧；右颞下颌关节前脱位的临床表现为前牙\_\_\_\_\_牙合，下颌骨及下颌牙中线偏向\_\_\_\_\_侧。【答案】开；患（右）；反、开；健（左）13.颞下颌关节紊乱病的主要临床表现有：\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。【答案】下颌运动异常；疼痛；弹响和杂音14.OSAS的全称是：\_\_\_\_\_，中文名：\_\_\_\_\_【答案】Obstructive sleep apnea syndrome；阻塞性呼吸睡眠暂

停综合症 三、问答题：1.试述下颌阻生智齿拔除的适应证。

(8分) 答案：阻生牙拔除的适应证是相当广泛的，若需拔除，最佳拔除时机在16~18岁(1分) 预防第二磨牙牙周破坏、预防龋齿、预防冠周炎、预防邻牙牙根吸收、预防牙源性囊肿和肿瘤的发生、预防发生疼痛、预防牙列拥挤。(每点1分) 2.试述上颌骨骨折的分类及临床表现。(9分) 答案：分型：Le Fort I~III型(1分) 及骨折线的走向(2分) 临表：骨折块移位、咬合关系错乱、眶及眶周变化、颅脑损伤(每一要点1.5分) 3.试述颌骨边缘性骨髓炎和中央性骨髓炎的鉴别诊断。(8分) 答案：中央性颌骨骨髓炎边缘性颌骨骨髓炎  
分值(1) 感染来源以龋病、牙周膜炎、根尖感染为主(1) 感染来源以下颌智齿冠周炎为主1(2) 感染途径是先破坏骨髓，后破坏骨皮质；再形成骨膜下脓肿或颌周间隙感染。因此，骨髓质与骨皮质多同时受累(2) 感染途径是先形成骨膜下脓肿或颌周间隙感染。主要破坏骨皮质，很少破坏骨髓质2(3) 临床表现可以是局限型，但以弥散型较多(3) 临床表现多系局限型，弥散型较少1(4) 骨髓炎病灶区周围牙松动，牙周有明显的炎症(4) 骨髓炎病灶区周围牙及牙周组织无明显的炎症1(5) 病变多在颌骨体，也可以波及下颌升支(5) 病变在下颌角及下颌支，很少起于或波及颌骨体1(6) 慢性期X线所见病变明显。可以有大块死骨块，与周围骨质分界清楚，或伴有病理性骨折(6) 慢性期X线所见病变多系骨质疏松、脱钙或骨质增生，或有不规则死骨，与周围骨质无明显分界2 4.简述颞下颌关节内强直和关节外强直的区别和诊断要点。(8分) 答案：关节内强直 关节外强直  
病史 化脓性炎症病史、损伤史 口腔溃烂、上下颌骨骨折史

、烧伤以及放射治疗史 2 颌间瘢痕 无 有 1.5 面下部发育 严重  
畸形（成年后患病不显） 畸形较轻（成年后患病无影响） 1.5  
咬合关系 严重错乱（成年后患病不显） 轻度错乱（成年后患  
病不显） 1.5 X线征象 关节间隙消失，关节部融合成骨球状 关  
节部正常，上颌与下颌之间间隙可以变窄 1.5 100Test 下载频  
道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)