

磺巯嘌呤钠（抗肿瘤药物）临床执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E7_A3_BA_E5_B7_AF_E5_98_8C_E5_c22_645985.htm

其他名称：6-巯基嘌呤磺酸钠溶癌灵溶癌呤 性状：针剂。功能主治：用于急性白血病、慢性粒细胞白血病、绒毛膜上皮癌和恶性葡萄胎、恶性淋巴瘤、多发性骨髓瘤。用法及用量：1.静注或静滴：（1）白血病：每日1次每千克体重4-5mg，溶于等渗盐水或5%葡萄糖液中静注或静滴。10-14日为1疗程。

（2）绒毛膜上皮癌或恶性葡萄胎：每日1次，每千克体重8-10mg，10日为1疗程。2.肌注或鞘内注射：每200mg需先溶于2ml0.24N稀醋酸液中。鞘内给药常用100-200mg，隔1-2日注射1次，5次为1疗程。不良反应和注意：1.主要是骨髓抑制，如血小板、白细胞等，伴有出血倾向。2.胃肠道反应有恶心、呕吐、腹泻、食欲不振等。3.大剂量时，可有口腔溃疡、肠溃疡及便血。4.偶有肝损害和黄疸。治疗白血病时常见高尿酸血症。其它：可致畸胎，故孕妇忌用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com