

环胞苷（抗肿瘤药物）临床执业医师考试 PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E7_8E_AF_E8_83_9E_E8_8B_B7_EF_c22_645986.htm 其他名称：环胞啉环胞甙盐酸环胞苷 性状：针剂，片剂。 功能主治：1.对各类急性白血病有效；2.脑膜白血病有良效；3.与其他类药物合用治疗实体瘤；4.眼科用于治疗单疱角膜炎。 用法及用量：1.静滴：成人每次200-600mg（每千克体重4-12mg），溶于5%葡萄糖液或等渗盐水注射液500ml中滴注，每日1次，连用5-10日为1疗程。2.肌注及口服：剂量同静脉注射。3.鞘内注射：用于脑膜白血病，成人50-100mg溶于等渗盐水注射液2ml中，每日或隔日1次。4.滴眼：每1-2小时滴眼1次，或用眼膏，每日涂药4-6次。 不良反应和注意：1.胃肠道反应有食欲减退、恶心、呕吐、腹泻、口腔炎、口腔溃疡。2.骨髓抑制：致使白细胞和血小板下降，严重者可有考，试大收集整理全血象抑制。3.少数病人有肝功能损害，可出现黄疸；敏感病人可有血尿酸过高、尿酸结晶尿及肾功能障碍。4.可见体位性低血压；偶有腮腺肿胀、转氨酶增高。 规格：针剂：每支50mg、100mg、200mg.片剂：每片100mg.生产厂家：是否医保用药：非医保是否非处方药：处方其它：肝功能不良者及孕妇慎用。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com