

环氧乳醇（抗肿瘤药物）临床执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E7_8E_AF_E6_B0_A7_E4_B9_B3_E9_c22_645988.htm 其他名称：二去水卫矛醇卫康醇 性状：针剂。 功能主治：对慢粒白血病有较好的近期疗效，缓解率为86%。对肺癌、多发性骨髓瘤、鼻咽癌等也有一定疗效，对各型肺癌的有效率，仅低于氮芥、丝裂霉素C和甲氨喋呤，但毒性则较轻。 用法及用量：静注或静滴：对慢粒白血病，成人每次40mg，小儿每千克体重0.6-1mg，每日1次，连用5-7日为1疗程，停药2周后进行下1疗程。病情缓解后，每月连用药5天作为维持治疗，为巩固疗效最好维持用药半年以上，剂量每日成人25mg，小儿每千克体重0.3-0.5mg，对肺癌等实体癌，用法用量同上，疗程间隔为2周；或对症治疗待血象恢复正常考试，大收集整理常后再进行下1疗程。去水卫矛醇，用等渗盐水10-20mg溶解，缓慢静注；或用等渗盐水5ml溶解后，加入5%葡萄糖液或5%葡萄糖盐水250-500ml中静脉滴注。 不良反应和注意：对慢粒白血病患者主要毒性反应为血小板减少（对实体瘤病人主要为白细胞及血小板减少）。此外，尚有食欲减退、呕吐、恶心、稀便、头昏、全身乏力等不良反应，停药后可自行消失。2.极少有肺和肝的合并症。 其它：静注时，注意勿漏出血管，以免引起局部组织坏死。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com