

环己亚硝脒（抗肿瘤药物）临床执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_\\_E7\\_8E\\_AF\\_E5\\_B7\\_B1\\_E4\\_BA\\_9A\\_E7\\_c22\\_645989.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E7_8E_AF_E5_B7_B1_E4_BA_9A_E7_c22_645989.htm) 其他名称：氯乙环己亚硝脒罗氮芥洛莫司汀 性状：胶囊。 功能主治：用于脑胶质瘤、消化道癌、何杰金病、淋巴肉瘤、网状细胞网瘤、肺癌及白血病，有一定疗效。 用法及用量：一般每平方米体表面积130mg，每6-8周口服1次，以3次为1疗程。 不良反应和注意：1.可使骨髓抑制、血小板、白细胞较迟发生，在第1及第4周可先出现2个白细胞低潮，第6-8周才恢复。2.偶有胃肠考试，大收集整理道出血及迟发性肝损害，肝功能不良者慎用，故应用本品前空腹先服胃复安或氯丙嗪，可减轻反应。 其它：1.本品与环磷山胺合用有协同作用。2.孕妇忌用。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)