

环磷酰胺（抗肿瘤药物）临床执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_\\_E7\\_8E\\_AF\\_E7\\_A3\\_B7\\_E9\\_85\\_B0\\_E8\\_c22\\_645990.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E7_8E_AF_E7_A3_B7_E9_85_B0_E8_c22_645990.htm)

其他名称：癌得散 癌得星 安道生 环磷氮芥

主要成分：性状：注射液、片剂。

功能主治：1.恶性淋巴瘤，特别是非何杰金淋巴瘤有较好的疗效。

2.乳腺癌，亦有相对疗效，可作为二线药物使用。

3.其他如小细胞肺癌，子宫肉瘤和急、慢性白血病也有效。

4.局部应用对乳腺癌引起的溃疡有显著疗效，对子宫颈癌也有效。

用法及用量：1.静注：每平方米体表面积400-600mg，每周1次，

总量8g左右为1疗程。

2.口服：每次50mg，一日3次。

3.必要时，也可作肌注（剂量同静注）、动脉内注射（每次100-500mg）

或鞘内注射（每次50-100mg）。不良反应和注意：1.由于

在被活化前无作用，所以与氮芥不同，无局部发和刺激作用

不考试，大收集整理引起局部坏死或静脉炎。

2.胃肠道反应：较氮芥轻，表现为食欲减退、恶心，大剂量注射亦可引起

呕吐，但不甚严重。

3.脱发较多见，一般在用药后3-4周出现，停药后可再生。

4.骨髓抑制：白细胞下降远较血小板下降明显。

本品引起的骨髓抑制虽较常见，但一般较易恢复。

5.中毒性膀胱炎：为特有的毒性反应，在大剂量注射时可见。

主要由于其水解产物在膀胱内浓集，引起膀胱刺激症状和少

尿、血尿、蛋白尿等。

6.肝功能损害较常见，对原有肝病病人应慎用。

7.少数病人尚可出现头昏、不安、幻视等不良反应。

8.偶有胃溃疡、出血等。其它：1.长期应用可致男性睾丸萎

缩、精子缺乏、妇女闭经、卵巢纤维化、畸胎等。

2.孕妇禁用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请

访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)