

临床执业医师 泪液缺乏型干眼临床执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E4_B8_B4_E5_BA_8A_E6_89_A7_E4_c22_645999.htm

泪液缺乏型干眼可采用以下方法：
滴用人工泪液：人工泪液需在眼睛感觉不舒服的时候点，但一天最好不超过6次，因为如果超过6次以上，就会把正常的泪膜冲走，从而加重症状。另外，大部分人工泪液也有保存剂，长期应用保存剂也会影响疗效。还可用药物刺激泪液的分泌，如匹罗卡品、新斯的明、肾上腺素、麻黄素、必嗽平等。
泪小点栓塞：如果上述治疗无效，可用泪小点栓子阻塞泪小点，或用火针、电凝、手术等方法封闭泪小点。这种方法使考，试大收集整理分泌量已经很少的泪液不再经泪小点排入鼻腔。泪小点栓子由柔顺的热变性疏水性丙烯酸材料制成，可以阻塞泪小点，使泪液的排出减少，从而起到保存泪液的目的，可以明显减少人工泪液的使用频率。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com