

2009年中药师中药剂学：骨痛灵酊执业药师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_2009\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_AD\\_c23\\_645030.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_645030.htm) id="song" class="chao"> 拼音名

：GutonglingDing 标准编号：WS3 - B - 3645 - 98 【处方】雪上一枝蒿80g 干姜110g 国产血竭1.0g 乳香5.0g 没药5.0g 冰片1.5g 【制法】以上六味，将雪上一枝蒿、干姜、没药、乳香研制成粗粉，混匀，照流浸膏剂与浸膏剂项下的渗漉法（附录 O），用50%乙醇适量作溶剂进行渗漉，收集渗漉液950ml；另将国产血竭、冰片溶于50ml乙醇中，与上述渗漉液合并，混匀，静置48小时，滤过，制成1000ml，即得。【性状】本品为橙红色的液体，久置有少许浑浊或沉淀；气香。【鉴别】（1）取本品40ml，水浴上挥去乙醇，加水使总量约20ml，稀盐酸调节pH2~3，转移至分液漏斗中，加氯仿15ml，振摇提取，弃去氯仿液，再加氯仿10ml，同上处理；水层加氨试液调节pH值9~10，用氯仿振摇提取2次（15、10ml），合并氯仿液，水浴上挥去氯仿，残渣加无水乙醇0.2ml使溶解，作为供试品溶液。另取雪上一枝蒿1g，置分液漏斗中，加氨试液1ml润湿后，加氯仿20ml，振摇提取30分钟，放置过夜，取氯仿液，残渣再加氯仿10ml，振摇提取一次，合并两次氯仿液，用0.1mol/L盐酸溶液15ml提取一次（pH值2~3），弃去氯仿液，酸液用氨试液调节pH值9~10，用氯仿5ml振摇提取一次，取氯仿液置水浴上挥干，残渣用无水乙醇0.5ml使溶解，作为对照药材溶液。照薄层色谱法（附录 B）试验，吸取供试品溶液20 $\mu$ l，对照药材溶液10 $\mu$ l，分别点于同一含羧甲基纤维素钠为粘合剂的硅胶G薄层板

上，以环己烷 - 二乙胺（8：2）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以稀碘化铋钾试液。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同的橙色斑点。来源

：www.examda.com（2）取本品20ml，置水浴上蒸干，残渣用乙醚适量搅拌溶解3次，倾出乙醚液，浓缩至0.5ml，作为供试品溶液。另取国产血竭对照药材10mg，加乙醚10ml，振摇，滤过，滤液浓缩至0.5ml，作为对照药材溶液。照薄层色谱法（附录 B）试验，吸取上述两种溶液各20 μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以氯仿 - 醋酸乙酯 - 冰醋酸（3：2：0.1）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中理，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同的蓝色荧光斑点。【检查】乙醇量应为45～55%

（附录 M）。总固体精密量取本品10ml，置称定重量的蒸发皿中，于水浴上蒸干，在105℃干燥3小时，称定重量。遗留残渣应不得少于12mg.其他应符合酊剂项下有关的各项规定

（附录 N）。【功能与主治】温经散寒，祛风活血，通络止痛。用于骨质增生、风湿性关节炎，类风湿性关节炎之疼痛，关节不利，活动受限，麻木等。来源：www.100test.com

【用法与用量】每次取本品25ml，浸于纱布上，贴患处，复盖一层塑料薄膜，再盖3～4层毛巾，用热水袋（水温90℃左右）置于毛巾上热敷，胸、腰椎部位敷40分钟，其余部位敷30分钟，一日1次；20天为一疗程。【注意】（1）本品只供外用，不可内服。用药后3小时内不得吹风，不接触冷水。

（2）本品放置后稍有浑浊，不影响疗效。【规格】每瓶装（1）100ml（2）250ml。【贮藏】密封，避光。更多信息请

访问：执业药师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 百

考试题执业药师加入收藏相关推荐：2009年中药师中药剂学  
：骨松宝颗粒 2009年中药师中药剂学：骨筋丸胶囊 100Test 下  
载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)