

2009年中药学：抗癌中草药喜树执业药师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_2009\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_AD\\_c23\\_645056.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_645056.htm) id="wang" class="chao"> 别名：旱莲（《植物名实图考》、江西、四川），旱莲木（《中国高等植物图鉴》）、天梓树（湖南），水桐树（广东、广西），干张树、千杖树、秧青树、水栗子（四川），园木、土八角（贵州）。性味功效：味苦、涩，性寒，有毒。抗癌，散结，清热杀虫。临床应用：适用于多种肿瘤，如食管癌、胃癌、直肠癌、肝癌、膀胱癌、卵巢腺癌、慢性粒细胞性白血病、急性淋巴细胞性白血病、淋巴肉瘤等。常与石打穿、蒲黄、丹参、枸橘李等配伍治疗瘀毒内阻、气滞血凝的消化道肿瘤。来源：考试大常与漏芦、狗舌草、青黛、夏枯草等配伍应用治气滞血瘀、痰火抑郁的淋巴肉瘤、白血病等。用法用量：每日3~9g，水煎服。注射剂（每支5mg）10~20mg溶于20ml生理盐水，隔日静脉注射，200~300mg为1疗程；混悬剂（每支5mg），每次2.5~5mg，（适用于肝癌与白血病），瘤内注射，溶于20ml生理盐水，每日1次，共3次；片剂5mg，每次5~10mg，每日或隔日口服，60~120mg为1疗程。注意事项：不良反应主要是泌尿道反应，如尿频尿急、尿痛及血尿，也可引起白细胞和血小板下降，其他有食欲下降、呕吐、腹泻和脱发。一般剂量对肝肾功能无影响，但对免疫功能有抑制作用，10-羟基喜树碱的不良反较轻而少。喜树碱耐量实验建议每日10mg或隔日20mg。更多信息请访问：执业药师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 百考试题执业药师加入收藏 相关推荐：2009年中药学：抗癌中草药砒砂

2009年中药学：抗癌中草药棉花根 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)