

2010年中药鉴定中药材：八月札执业药师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_2010\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_AD\\_c23\\_645443.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_645443.htm) id="deng" class="kuang"> 【出处】

《饮片新参》 【拼音名】Bá Yuè Zhá 【别名】燕蓄子（孟诜），畜蓄子、拿子（《本草拾遗》），桴子（《食性本草》），覆子（《日华子本草》），木通子（《本草汇言》），八月瓜（《分类草药性》），八月炸（《南京民间药草》），野毛蛋（《安徽药材》），冷饭包（《浙江中药手册》），野香蕉（《江苏植药志》），羊开口、玉支子（《中药志》），腊瓜（湖南）。 【来源】为本通科植物木通、三叶木通、白本通的果实。8~9月间果实成熟时采摘，晒干，或用沸水泡透后晒干。百考试题论坛 【原形态】 木通落叶或半常绿缠绕藤本，高达3米以上。枝灰色，有条纹，皮孔突起。掌状复叶，通常3~5叶簇生于枝端，或互生；叶柄细长；小叶5枚，革质，椭圆形，长3~6厘米，宽1.5~2.6厘米，先端圆而微凹，并具一细短尖，基部宽楔形或圆形，全缘，下面稍呈粉白色。花雌雄同株，总状花序腋生，长约10厘米；花紫色；雌花1~2朵生于花序下部，苞片线状披针形，花被3，宽椭圆形，钝头，退化雄蕊6，雌蕊6，圆筒状，子房1室，柱头头状；雄花密生于花序上部，较小，具小苞片，花被3，雄蕊6，花丝扁，花药2室，退化雌蕊3或4。蓇葖状浆果，长筒形，两端圆，长达8厘米，宽达3厘米，成熟时紫色，沿腹缝线开裂。种子黑色，甚多，卵状长方形，稍扁，有光泽。花期4~6月。果热期8月。生长于山林间。分布河南、山东、安徽、江苏、广东、江西、湖南、湖北、四川、陕西等

地。 三叶木通 落叶本质藤本，茎、枝都无毛。三出复叶，小叶卵圆形、宽卵圆形或长卵形，长宽变化很大，先端钝圆、微凹或具短尖，基部圆形或宽楔形，有时微呈心形，边缘浅裂或呈波状，侧脉通常5~6对；叶柄细瘦，长6~8厘米。花序总状，腋生，长约8厘米；花单性；雄花生于上部，雄蕊6；雌花花被片紫红色，具6个退化雄蕊，心皮分离，3~12。果实肉质，长卵形，成熟后沿腹缝线开裂；种子多数，卵形，黑色。生于山坡、灌丛或沟缘。分布河北、山西、山东、河南、陕西、甘肃、浙江、安徽、湖北等地。 白木通 本变种形态与三叶木通相近，但小叶全缘，质地较厚。参见木通条。以上三种植物的根（木通根）、木质茎（木通）、种子（预知子）亦供药用，各详专条。 www.Examda.CoM 【性状】干燥的肉质浆果呈卵状圆柱形，稍弯曲，长3~8厘米，直径2.5~3.5厘米，顶端钝圆，基部具果柄痕。表面浅黄棕色至土棕色，皱缩，成熟者皱纹粗大而疏，未熟者皱纹细小而密。果皮厚，革质或微角质。种子多数，包被在絮状果瓢内，形状不规则，呈圆形、长圆形或卵圆形，略扁平，外表红棕色或棕黑色，有光泽，皱纹细密。果肉气微香，味涩而淡。以肥壮、皮皱者为佳。产江苏、浙江、安徽、陕西等地。西藏地区使用的八月札，为同科植物五风藤的果实；四川地区除用白木通的果实外，还使用狭叶八月瓜的果实。 【炮制】洗净，稍浸，闷润至透，切片晒干，或洗净晒干，用时捣碎。 【性味】甘，寒。 孟诜：平。 《食性本草》：寒，无毒。 《四川中药志》：性温平，味苦涩辛，无毒。 【功能主治】来源:百考试题网 舒肝理气，活血止痛，除烦利尿。治肝胃气痛，胃热食呆，烦渴，亦白痢疾，腰痛，胁痛，

疝气，窟经，子宫下坠。 崔禹锡《食经》：食之去淡（痰）水，止赤白下利。 孟诜：厚肠胃，令人能食，下三焦，除恶气，和子食之更好。通十二经脉。 《本草拾遗》：利大小便，宣通，去烦热，食之令人心宽，止渴，下气。 《食性本草》：主胃口热闭，反胃不下食，除三焦客热。 《本草汇言》：以蜜水煮食之，治噤口热痢。 《南京民间草药》：治腰痛。 《四川中药志》：疏肝，纳肾气。治膀胱疝气，吐血。 《药材学》：利气，活血，杀虫，解毒，止痛。用于肝胃气痛，胁痛，月经痛等症。 《陕西中草药》：疏肝益肾，健脾和胃。治消化不良，腹痛，泻痢，疝气，子宫下坠。 【用法用量】内服：煎汤，0.5~1两；或浸酒。 【附方】 治淋巴结核：八月札、金樱子、海金沙根各四两，天葵子八两。煎汤分三天服。（苏医《中草药手册》） 治胃肠胀闷：三叶木通根或果一两，水煎服。（《浙江民间常用草药》） 来源：考试大 【临床应用】治疗输尿管结石取腊瓜、尿珠子各2两，加水6碗，煎成2碗，去渣，加糖，分2次服。治疗30例，治愈（结石排出、症状消失、X线摄片结石阴影消失）19例，进步（结石位置明显下降）2例，无效（结石位置无改变）9例，总有效率70%、排石率63.3%。为了加速输尿管结石的排出，可定期综合采用新针（三阴交、阴陵泉、肾俞），内服654-2（山莨菪）、双氢克尿塞及大量饮水，加强活动等措施，以促使结石排出。治疗20例，治愈（标准同前）10例，进步5例，无效5例。有效率为75%，排石率50%。若输尿管结石并发尿路感染、输尿管粘膜水肿者，除上述综合措施外，可在腊瓜、尿珠子方内加入蛇莓、杠板归各5钱。治疗15例，治愈12例，无效3例，排石率为80%。

在输尿管结石绞痛发作时，表明结石的位置有移动，此时采用综合措施，可加速排石；这些综合措施有时须反复多次采用，才能发挥作用。对并发高血压的患者，在服腊瓜、尿辣子煎剂同时，可同时服用降压药物，待血压恢复正常后，再定期采用综合措施。一般结石直径在1厘米以下者，排石的可能性较大。更多信息请访问：执业药师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 百考试题执业药师加入收藏 相关推荐：2010年中药鉴定中药材：八月炸 2010年中药鉴定中药材：八爪金龙 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)