

2010年中药鉴定中药材：八月瓜执业药师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_645444.htm id="wang" class="chao"> 【拼音名】 B á Yu è Gu ā 【别名】 牛腰子果、六月瓜、小八瓜、哪瓜、黄狗肾、木王瓜、八月果、野人瓜、刺藤果、牛懒袋果。 【来源】 药材基源：为木通科植物五风藤、宽叶八月瓜和小花八月瓜的果实。 拉丁植物动物矿物名

：1.*Holboellia fargesii* Reaub. 2.*Holboellia latifolia* Wall. 3.*Holboellia parviflora* (Hemsl.) Gagnep. 采收和储藏：秋季果熟时采摘，晒干。 <http://ks.100test.com> 【原形态】 1.五风藤 常绿本质藤本，长3-8m。树皮黄褐色，分枝圆柱形，茎、枝都无毛。掌状复叶；叶柄长1.5-8cm；小叶5（3）-7（9），小叶柄较纤细，长0.5-2cm；小叶狭长圆形、倒卵状披针形至狭披针形，长2-7cm，宽0.6-2cm，大小变化极大，先端具小短尖，基部楔形，叶下面灰白色，侧脉不明显，全缘，两面光滑无毛。花单性，雌雄同株，为簇生叶腋的伞房花序，每一总梗具1-3朵花；小苞片小，几乎不明显；雄花少，绿白色，较大，长约1.5-2cm，萼片6，不等长，近肉质，长圆状匙形，先端钝而增厚，花瓣（蜜腺）鳞片状，近圆形或三角形，宽约0.5mm；退化雌蕊花药状0.75mm，心皮3，胚珠多数，排成5列。果紫色，长圆形，先端钝圆，长7-9cm。花期4-5月，果期6-10月。 2.宽叶八月瓜 常绿藤状灌木，长达5m，全株无毛。掌状复叶；小叶3-7，无毛，厚革质；叶柄长5-11cm；小叶柄不等长，长0.6-3cm；小叶卵圆形或倒卵状长圆形至椭圆形，长5-7cm，宽2.5-4.5cm，生于主茎上的长5-15cm，先端渐尖

或尾状渐尖，基部阔楔形或圆形，上面暗亮绿色，下面浅绿色。花为簇生叶腋的伞房花序，极芳香，单性，雌雄同株；雄花萼片6，2列，长1.5-1.7cm，绿白色，狭长圆形；花瓣6，微小，雄蕊长1.2cm，花药比花丝短，花药长5mm，花丝长7mm；雌花较大，萼片长2.2cm，紫色，花瓣6，小，有假雄蕊6，雌蕊3，子房3室。果常为2-3个一束，不规则长圆形，腊肠状，长5-16cm，径约3cm，熟时紫红色，含多数种子。花期5-7月，果熟期8-9月。3.小花八月瓜 攀援灌木。各部无毛，枝条具条纹。叶为羽状3小叶，薄革质；叶柄长7-9cm，圆柱形，纤细；小叶柄长0.5-2.5cm；小叶披针形或长圆状披针形，长6-11cm，宽2-5.5cm，先端长渐尖或尾状渐尖，基部钝或圆形，上面光滑，下面脉明显。花（仅见雄花）小，肉质，多花形成具短梗的伞房花序，簇生叶腋；花柄纤细，长0.5-1.5cm；苞片近圆形，大，宽约5mm；萼片外轮3个肥厚，卵形，内凹，长约5mm，钝，内轮3个较薄，披针形，长约3mm，锐尖；花瓣（蜜腺）长1mm；雄蕊6，向内的与萼片等长，互生的稍短，花丝分离，肉质，圆柱形，花药短，药室邻近，药隔不伸出。果实浆果状，椭圆形，紫红色。【生境分布】 来源：www.100test.com 生态环境：1.生于山坡、路旁、河边、林缘和阔叶林内。2.生于山地杂木林或灌木丛中。3.生于海拔1500-1900m的石山林缘。资源分布：1.分布于陕西、安徽、浙江、福建、湖北、广东、四川、云南等地。2.分布于贵州、云南、四川、西藏等地。3.分布于云南东南部。【性味】 苦；凉 【归经】 膀胱；心；肝经 来源：www.examda.com 【功能主治】 清热利湿；活血通脉；行气止痛。主小便短赤；淋浊；水肿；风湿痹痛；跌打损伤；乳

汁不通；疝气痛；子宫脱垂；睾丸炎 【用法用量】 内服：煎汤，3-9g. 【摘录】 《中华本草》 更多信息请访问：执业药师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 百考试题执业药师加入收藏 相关推荐： 2010年中药鉴定中药材：八月炸 2010年中药鉴定中药材：八月札 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com