

2010年中药鉴定中药材：八仙草执业药师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_2010\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_AD\\_c23\\_645447.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_645447.htm) id="deng" class="kuang"> 【出处】

《滇南本草》【拼音名】B Xi nC o【别名】猪殃殃（《野菜谱》），小锯藤、锯子草（《贵州民间方药集》），小茜草、小飞扬藤、红丝线、血见愁（《广西中药志》），细茜草（《云南中草药》）。【来源】为茜草科植物拉拉藤或粗叶拉拉藤的全草。秋季采收，晒干或晾干。【原形态】拉拉藤（《植物名实图考》）一年生草本，蔓状或攀缘状，长20~40厘米。茎绿色，纤弱，四方形，分枝，棱上有倒生小刺。叶6~8枚轮生，无柄，膜质，线状披针形至椭圆状披针形，长2~4厘米，宽2~6毫米，先端具针锋尖头，上面绿色，被倒生白色刺毛，下面淡绿色，除沿中脉及边缘被毛外，余光滑无毛，侧脉不明显。疏散聚伞花序，腋生；花细小，直径约1毫米；萼截头状，长不及1毫米，有钩毛；花瓣4，淡绿白色，有时染以紫色，卵形，极短；雄蕊4，与花瓣互生；子房下位，2室，花柱2裂。果稍肉质，孪生，表面密生白色钩毛。花期4~5月。生于荒地、园圃、耕地上。全国大部分地区有分布。粗叶拉拉藤，又名：锯锯藤。一年生草本。偃卧或稍斜举。茎六棱形，具分枝，枝上有小倒刺，粗糙。叶4~8枚轮生，叶片膜质，线状披针形以至椭圆状披针形，长1.8~4厘米，宽3.3~6.6毫米，先端具针状尖头，向下渐狭；全缘，具毛茸，基部抱茎。花生于叶腋，小花3~8朵，排成疏散的聚伞花序；花萼4枚，截头状；花冠轮状，极细小，直径不到1.5毫米；花瓣4枚，卵形，绿白色或有紫

晕，仅基部联合。果实稍肉质，密被钩状白毛。花期春季。生于山坡、路旁。分布于云南、广西等地。【性状】来源：考试大 干燥全草黄绿色或枯黄色，全体具有棘手的倒刺，茎叶多卷缩成团。茎坚韧，纤维性，叶脆，易破碎。果实多脱落，留有伞形的果柄。产云南、贵州、广西等地。【性味】苦辛，寒。《滇南本草》：味辛苦，性微寒。来源：考试大 《广西中药志》：味涩，性平。《湖南药物志》：甘涩，微寒。【归经】《滇南本草》：入少阴、太阴经。【功能主治】清湿热，散瘀，消肿，解毒。治淋浊，尿血，跌打损伤，肠痛，疖肿，中耳炎。《滇南本草》：治湿热，诸经客热，虚癆，童癆，筋骨疼痛，热淋，赤白便浊，玉茎痛。退血分烦热，止尿血。《贵州民间方药集》：治疥癣。《广西中药志》：治妇人痛经。又捣烂取汁冲糯米浆，治飞扬疮。百考试题(100test.com) 江西《草药手册》：清热解毒，消肿止痛。治痈肿，阑尾炎，近用于治癌。《昆明民间常用草药》：清热消炎，祛风湿，散瘀血，治痰火热症，风热眼雾眼屎多，风湿跌打疼痛，外伤皮下瘀肿。《云南中草药》：清热凉血，利尿。治血淋，尿路感染。【用法用量】内服：煎汤，2~5钱；或捣汁饮。外用：捣敷或捣汁滴耳。【附方】 治五淋：八仙草三钱，滑石二钱，甘草一钱，双果草二钱。水煎点水酒服。（《滇南本草》） 治妇女经闭：猪殃殃二钱。水煎服。（《湖南药物志》） 治跌打损伤：鲜猪殃殃根、马兰根各四钱。水酒各半煎服。另以鲜猪殃殃全草、酢浆草等分，捣烂外敷。 治感冒：鲜猪殃殃一两，姜三片。搗汁冲开水服。 治疖肿初起：鲜猪殃殃适量，加甜酒捣烂外敷，日换二次。来源：考试大 治急性

阑尾炎：鲜猪殃殃三两。煎水内服。 治乳癌：鲜猪殃殃四两。捣汁和以猪油敷于癌症溃烂处，亦可煎水内服。 治牙龈出血：鲜猪殃殃二至三两。水煎服。（方以下出江西《草药手册》） 治中耳炎：鲜猪殃殃，捣汁滴耳。（《云南中草药》）

【临床应用】 治疗菌痢 拉拉藤干品0.5~2两水煎，每日2次分服；或制成片剂，每片0.3克，每次10片，日4次；或用浸膏片，每片0.3克，每次4片，日4次。观察72例，治愈（症状消失，大便镜检、培养均阴性）69例，好转（症状消失，但大便培养阳性）2例，无效1例。平均住院9.23天。

来源：考试大 治疗肿瘤 新鲜拉拉藤半斤绞汁，加红糖适量冲服，每日1剂；或用干品1两洗净切碎，水煎30~60分钟，加红糖适量，每日1剂，3~6次分服；或以干品洗净切碎，放铁锅中烙片刻取出，每日1两，开水冲泡，分次频服。治疗乳腺癌、食道癌、下颌腺癌、子宫颈癌共9例，其中临床痊愈（症状消失，客观检查肿瘤消失，劳动力恢复，观察1年以上病情未复发）1例，显效（症状大部分消失，肿瘤明显缩小，劳动力有所改善，并维持1年以上）3例，有效（症状减轻，肿瘤稳定或稍有缩小，病情稳定6个月以上）2例，无效3例；治疗良性肿瘤6例，其中显效2例，有效4例。疗程最短1月多，最长2年。长期服用无毒性反应及明显副作用，仅部分病人服后有头昏、恶心等。若加红糖服用，反应可减轻；同时配服中药益气养营以扶正，反应可基本消失。更多信息请访问：[执业药师网校](#) [百考试题论坛](#) [百考试题在线考试系统](#) [百考试题执业药师加入收藏](#) 相关推荐：2010年中药鉴定中药材：八仙过海 2010年中药鉴定中药材：八仙花 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)