

2010年中药鉴定中药材：巴豆叶执业药师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_2010\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_AD\\_c23\\_645466.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_645466.htm) id="zhongxiao" class="shan">

【出处】出自《南宁市药物志》。【拼音名】B Dòu Yè 【英文名】Croton Leaf 【别名】双眼龙叶、大叶双眼龙叶。【来源】百考试题(100test.com) 药材基源：为大戟科植物巴豆 *Croton tiglium* L. 的叶。拉丁植物动物矿物名：*Croton tiglium* L. 采收和储藏：随采随用，或采后晒干用。【原形态】巴豆 灌木或小乔木，高2-10m. 幼枝绿色，被稀疏星状毛，老枝无毛。单叶互生；叶柄长2-6cm；托叶线形，长2-4mm，早落；叶膜质卵形至长圆状卵形，长5-15cm，宽2.5-8cm，先端渐尖或长渐尖，基部圆形或阔楔形，近叶柄处有2枚无柄的杯状腺体，叶缘有疏浅锯齿，齿尖常具小腺体，幼时两面均有稀疏星状毛，后变无毛或在下面被极少数星状毛，干时呈淡黄色。总状花序顶生，长5-14cm，有时达观20cm，上部着生雄花，下部着生雌花，也有全为雄花而无雌花的；苞片钻状，长约2mm；雄花花梗细而短，长3-4mm，有星状毛；雄花绿色，较小；花萼5深裂，先端疏生星状毛，裂片卵形，长约2mm；花瓣5，长圆形，与花萼几等大，反卷，内面和边缘生细绵毛；雄蕊15-20，着生花盘边缘，花丝上部被柔毛，花药干时呈黑色；花盘盘状，边缘有浅缺刻；无退化子房；雌花花梗较粗，长2-3mm；花萼5深裂，裂片长圆形，外被星状毛，长约2.5mm；无花瓣；子房倒卵形，密被粗短的星状毛，3室，每室1胚珠，花柱3，每个2深裂。蒴果倒卵形至长圆形，有3钝角，长约2cm，近无毛或被稀疏星状毛，种子3颗，

长卵形，背面稍凸，淡黄褐色，长约是1cm，宽6-7mm.花期3-10月，果期7-11月。【生境分布】来源

：www.examda.com 生态环境：生于山野、丘陵地，房屋附近常见栽培。资源分布：分布于西南及福建、湖北、湖南、广东、广西等地。【性状】性状鉴别 单叶，具柄；叶片卵形或椭圆状卵形，长7-17cm宽3-7cm，先端长尖，基部阔楔形，边缘有浅疏锯齿；上面深绿色，下面较淡，幼叶两面疏被星状毛，基部具3脉，近柄两侧各具1腺体。气微，有毒。【药理作用】巴豆叶的盐水浸出液在体外试验中，对大肠杆菌有抑制作用。【性味】辛；温；有毒【归经】三焦；大肠经【功能主治】祛风活血；杀虫解毒。主疟疾；痹证；跌打损伤；缠腰火丹；疮癣；蛇伤【用法用量】内服：研末酒冲，或胶囊装，0.03-0.15g.外用：适量，煎水洗，或浸酒搽。【各家论述】1.《岭南采药录》：治恶疮，痰核，疮癣，疥癩等疾。2.《南宁市药物志》：治蛇伤，理跌打。百考试题(100test.com)【摘录】《中华本草》更多信息请访问：执业药师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 百考试题执业药师加入收藏 相关推荐：2010年中药鉴定中药材：巴戟天 2010年中药鉴定中药材：巴豆油 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)