

2010年西药师药剂学辅导：双黄连注射液执业药师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E8_A5_BF_c23_645472.htm id="song" class="chao"> 拼音名

：ShuanghuanglianZhusheye 标准编号：WS3-B-2104-96来源
：www.100test.com 【处方】金银花250g 黄芩250g 连翘500g 【
制法】以上三味，黄芩酌予碎断，加水煎煮二次，每次1小
时，分次滤过，合并滤液，滤液用盐酸（2mol/L）调pH至1.0
~ 2.0，在80 保温30分钟，静置24小时，滤过，沉淀加8倍量
水，搅拌，用40%氢氧化钠溶液调pH至7.0，并加等量乙醇，
搅拌使溶，滤过，滤液用盐酸（2mol/L）调pH至2.0，60 保
温30分钟，静置12小时，滤过，沉淀用乙醇洗至pH至4.0，
加10倍量水，搅拌，用40%氢氧化钠溶液调pH至6.0，加
入0.5%活性炭，充分搅拌，50 保温30分钟，加入1倍量乙醇
搅拌均匀，立即滤过，滤液用盐酸（2mol/L）调pH至2.0，60
保温30分钟，静置12小时，滤过，沉淀用少量乙醇洗涤后
，于60 以下干燥。金银花、连翘加水浸渍30分钟，煎煮二
次，每次1小时，分次滤过，合并滤液，浓缩至相对密度
为1.20~1.25（70~80 测），放冷至40 ，缓缓加乙醇使含
醇量达75%，充分搅拌，静置12小时，滤取上清液，回收乙醇
至无醇味，加入3~4倍量水，调pH至7.0，充分搅拌并加热至
沸，静置48小时，滤取上清液，浓缩至相对密度为1.10~1.15
（70~80 测），放冷至40 ，加入乙醇使含醇量达85%，静
置12小时，滤取上清液，回收乙醇至无醇味，备用。取黄芩
提取物，加水适量，加热并用40%氢氧化钠溶液调pH至7.0使
溶解，加入金银花、连翘提取液，加水至1000ml，加入0.5%

活性炭，保持pH值7.0加热微沸15分钟，冷却，滤过，加注射用水至1000ml，灌封，灭菌，即得。来源：www.examda.com

【性状】本品为棕红色的澄明液体。来源：考试大【功能与主治】清热解毒，清宣风热。用于外感风热引起的发热、咳嗽、咽痛。适用于病毒及细菌感染的上呼吸道感染、肺炎、扁桃体炎、咽炎等。www.Examda.CoM【用法与用量】静脉注射，一次10~20ml，一日1~2次。静脉滴注，每次公斤体重1ml，加入生理盐水或5~10%葡萄糖溶液中。肌注一次2~4ml，一日2次。【规格】每支20ml.来源:百考试题网【贮藏】密封，避光，置凉暗处。更多信息请访问：执业药师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 百考试题执业药师加入收藏 相关推荐：2010年西药师药剂学辅导：双虎肿痛宁 2010年西药师药剂学辅导：双丹膏 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com