

2010年执业西药师：异帕米星的相互作用执业药师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2010_E5_B9_](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E6_89_A7_c23_645585.htm)

[B4_E6_89_A7_c23_645585.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E6_89_A7_c23_645585.htm) id="yao" class="ming"> 本品与青霉素、羧苄西林、哌拉西林、头孢噻肟联合具协同作用；与麻醉剂和肌肉松弛剂合用可致呼吸抑制；与强利尿剂合用可加重本品的耳肾毒性；与酸性溶液混合可降低本品抗菌活性。不与麻醉药、肌肉松弛药以及强利尿剂合用；不与酸化尿液的药物合用。百考试题(100test.com) (1) 与右旋糖酐、藻酸钠等血浆代用品联用可加重肾损害作用。来源：考试大

(2) 与肌松药联用可有加重神经-肌肉阻滞而致呼吸肌麻痹等危险。(3) 与襻利尿药（呋塞米等）联用，可加重肾损害和听觉损害。www.Examda.CoM (4) 与青霉素类、头孢菌素类同置一容器中，本品的活力可降低。必需联用时应分别给予。更多信息请访问：执业药师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 百考试题执业药师加入收藏 相关推荐：

2010年执业西药师：异帕米星的不良反应 2010年执业西药师

：异帕米星的禁用慎用 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com