

2010年执业西药师：依酚氯铵的给药谁明执业药师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E6_89_A7_c23_645587.htm id="song" class="chao">

(1) 为作用短而且快的胆碱酯酶抑制药，对神经肌接头的选择性较高，而副作用较少。可用于对非去极化肌松药的拮抗，能使自发呼吸尽快恢复。(2) 可用于诊断重症肌无力，但不作为治疗用药。(3) 有兴奋迷走神经样作用，能延长心房肌的有效不应期，阻抑房室结传导，纠正阵发性室上性或房性心动过速。来源：考试大(4) 特点有：

可用于鉴别重症肌无力患者新斯的明或吡斯的明等治疗用量不足、恰当或逾量；可用于鉴别去极化肌松药的作用是停留在相，还是已进入相，相时为增效，相时为拮抗；不一定要与阿托品合用，因为万一出现心动过缓，数分钟即可消失，但老年人和衰弱者除外。来源：考试大(5) 缺点有；本品作用持续短而一般肌松药持续时间长，拮抗有效后务必继续观察3060分钟，以免肌松再度出现；不良反应出现快，应及早做好对症处理准备；不宜用于手术后腹胀或尿潴留的治疗；凡是应用洋地黄类药的病人，本品的迷走神经样作用格外明显，慎用或禁用。更多信息请访问：执业药师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 百考试题执业药师加入收藏 相关推荐：2010年执业西药师：依酚氯铵的不良反应 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com