

2010年中药鉴定中药材：白桂木根执业药师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_2010\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_AD\\_c23\\_645708.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_645708.htm) 【拼音名】Bái Guì Mù G

n 【别名】将军树根 【来源】药材基源：为桑科植物白桂木的根。拉丁植物动物矿物名：1.*Artocarpus hypargyrea* Hance.2.*Artocarpus nitidus* Trec.subsp.*lingnanensis* (Merr.

) Jarr.[*A.lingnanensis* Merr.] 采收和储藏：全年可采，洗净，切片，晒干。 【原形态】来源：[www.100test.com](http://www.100test.com) 1.乔木，高达10m，全株有乳汁。树皮暗紫色，成薄片剥落；小枝被略紧贴的柔毛。单叶互生，2列；叶柄长1-2.2cm，有短毛；托叶线形或狭三角形，长约2mm，被毛，脱落后有疤痕；叶片椭圆形或倒卵状长圆形，长7-22cm，宽3-8.5cm，先端渐尖或短渐尖，基部楔形，全缘，嫩叶常为羽状浅裂，上面无毛有光泽，下面密被灰白色短绒毛；侧脉7-9对，与细脉交织成网脉在背面突起。花单性，雌雄同株；雄花序单个腋生，倒卵形或棒状形，长1.5-2cm，直径1-1.5cm，总花梗长1-2cm，被浅灰色短柔毛；雄花有花被片4，分离，线形或匙形，长1mm，密被微柔毛；雄蕊1，花丝长椭圆形，花药椭圆形。聚合果近球形，直径3-4cm，黄色，干时褐色，被短毛，表面有不明显、宿存的乳状突起，萼片近轴部分分离，结果时约12枚；果柄长3.5-6.5cm，被短柔毛。花期春末夏初，果期秋季。2.桂木与白佳木的区别在于：叶片椭圆形或卵状长椭圆形，先端钝或短渐尖。聚合果直径达5cm，鲜时红色，干后褐色，被绒毛；种子10-15颗。 【生境分布】百考试题 - 全国最大教育类网站(100test.com) 生态环境：1.生于低海拔的温暖山区、路

旁、林缘或疏林中。 2.生于低海拔的山地、林缘，多栽培。  
资源分布：1.分布于广东、广西、云南等地。 2.分布于广东、海南、广西、云南等地。 【性味】甘；淡；性温 来源：考试大 【功能主治】祛风利湿；活血通络。主风湿痹痛；头痛；产妇乳汁不足 【用法用量】内服：煎汤，15-30g；或浸酒。

【摘录】《中华本草》 更多信息请访问：执业药师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 百考试题执业药师加入收藏 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)