

2010年中药鉴定中药材：白花菜执业药师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_645760.htm 【出处】汪颖《食物本草》。

【拼音名】Bái Hu Cài 【英文名】Spiderflower, Common Spiderflower 百考试题 - 全国最大教育类网站(100test.com) 【别名】羊角菜、屙析草、臭花菜、臭豆角、猪屎草、五梅草、白花仔草。 【来源】药材基源：为白花菜科植物白花菜的全草。拉丁植物动物矿物名：Cleome gynandra L.[Gynandropsis pentaphylla (L.) Briq.] 采收和储藏：夏季采收全草，鲜用或晒干。 【原形态】白花菜一年生直立分枝草本，高约1m.常被腺毛。叶为3-7小叶的掌状复叶，叶柄长2-7cm，小叶柄长2-4mm；小叶倒卵状椭圆形、倒披针形或菱形，先端渐尖、急尖、钝形或圆形，基部楔形至渐狭延成小叶柄，边缘有细锯齿或有腺毛，中央小叶长1-5cm，宽8-16mm，侧生小叶依次减小。总状花序长15-30cm；苞片由3枚小叶组成；花梗长约1.5cm；萼片分离，披针形，椭圆形或卵形，长3-6mm，宽1-2mm，被腺毛；花瓣白色，少有淡黄或淡紫色，在花蕾时期不覆盖着雄蕊及雌蕊，连爪长10-27mm，瓣片近圆形或阔倒卵形，宽2-6mm；花盘稍肉质，雄蕊6，伸出花冠外；雌雄蕊柄长5-18mm；雌蕊柄在两性花中长4-10mm，在雄花中长1-2mm，或无柄；子房线柱形，花柱很短，柱头头状。果圆柱形，斜举，长3-8cm，中部直径3-4mm；种子扁球形，黑褐色，表面有横向皱纹或更常为具瘤状小突起。花、果期约在7-10月。来源

：www.examda.com 【生境分布】来源：www.100test.com 生

态环境：生于低海拔地区田野、荒地。资源分布：分布于我国华北及其以南至台湾、广东、海南等地。【栽培】生物学特性喜温暖湿润气候，喜肥水，幼苗期缺水影响生长发育。一般土壤都能栽种，以疏松、肥沃或微碱性、微酸性土壤生长较好。栽培技术种子繁殖，北方于4月上旬至6月上旬播种，施足底肥，翻耕耙平，按行距30-60cm，顺畦开3-4cm浅沟，将与沙混合的种子均匀撒于沟内，覆土，镇压，播后浇水。南方于4月播种，作1.3m高畦，施入人畜粪后播种，按行株距50cm×30cm点播，每1hm²用种量3.75kg。播后2星期出苗。种子千粒重0.879，不耐贮藏，隔年种子发芽率显著降低。田间管理当幼苗长出2-3片真叶，进行间苗，苗高15cm时按株距30cm定苗。为提高产量，结合松土除草，现蕾前追施氮、磷肥。【性状】性状鉴别茎多分枝，密被粘性腺毛。掌状复叶互生，小叶5，倒卵形或菱状倒卵形，全缘或有细齿；具长叶柄。总状花序顶生；萼片4，花瓣4，倒卵形，有爪；雄蕊6，雌蕊子房有长柄。蒴果长角状。有恶臭气。【化学成份】含辛味挥发油，与大蒜油、芥子油相似。百考试题论坛【药理作用】叶有抗刺激作用。【性味】辛；甘；平【归经】肝；脾经【功能主治】祛风除湿；清热解毒。主风湿痹痛；跌打损伤；淋浊；白带；疟疾；痢疾；痔疮；蛇虫咬伤【用法用量】内服：煎汤，9-15g。外用：适量，煎水洗或捣敷。【注意】汪颖《食物本草》：多食动风气，滞脏腑，令人胃中闷满，伤脾。【各家论述】1.汪颖《食物本草》：下气。来源：www.100test.com 2.《纲目》：煎水洗痔；捣烂敷风湿痹痛；搗酒饮，止疟。3.《生草药性备要》：治跌打，理蛇咬伤。4.《中国药植图鉴》：止下痢。采集者退散【摘录】《

中华本草》更多信息请访问：执业药师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 百考试题执业药师加入收藏 相关推荐：2010年中药鉴定中药材：白花菜子 2010年中药鉴定中药材：白花菜根 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com