

2010年中药鉴定中药材：柏枝节执业药师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_645852.htm

【出处】出自《唐本草》【拼音名】Bǐ Zhī Jié【来源】采集者退散 药材基源：为柏科植物侧柏的枝条。拉丁植物动物矿物名：Platycladus orientalis (L.) Franco[Thujaorientalis L.; Biota orientalis (L.) Endl.] 采收和储藏：全年均可采收，以夏、秋季采收者为佳。剪取树枝，置通风处风干用。【原形态】常绿乔木，高达20m，胸径可达1m.树皮薄，浅灰褐色，纵裂成条片。小枝扁平，直展，排成一平面。叶鳞形，交互对生，长1-3mm，先端微钝，位于小枝上下两面之叶露出部分倒卵状菱形或斜方形，两侧的叶折覆着上下之叶的基部两侧，呈龙骨状。叶背中部均有腺槽。雌雄同株；球花单生于短枝顶端；雄球花黄色，卵圆形，长约2mm.球果当年成熟，卵圆形，长1.5-2cm，熟前肉质，蓝绿色，被白粉；熟后木质，张开，红褐色；种鳞4对，扁平，背部近先端有反曲的尖头，中部种鳞各有种子1-2颗。种子卵圆形或长卵形，长4-6mm，灰褐色或紫褐色，无翅或有棱脊，种脐大而明显。花期3-4月，球果9-11月成熟。【生境分布】来源：考试大百考试题 - 全国最大教育类网站(100test.com) 生态环境：生于湿润肥沃地，石灰岩石地也有生长。资源分布：分布于东北南部，经华北向南过广东、广西北部，西至陕西、甘肃、西南至四川、云南、贵州等地。采集者退散【化学成份】木材含挥发油，其中大部分是倍半萜醇，约占50%，内有：-、及-柏木烯（cedrene），韦得醇（widdrol），-、-及-花侧柏萜醇（cuparenol），-

异花侧柏萜醇（*-isocuparenol*），*-*及*-*侧柏萜醇（*biotol*），*-*异侧柏萜醇（*-isobiotol*），美黄烯醚（*curcum-enether*）等；其次是倍半萜烯，约占40%，内有：罗汉柏烯（*thu-jopsene*），罗汉柏二烯（*thujopsadiene*），*-*及*-*柏木烯（*cedrene*），*-*花柏烯（*-chamigrene*），*-*及*-*二氢花侧柏烯（*cuprenene*），*-*姜黄烯（*-curcumene*），去氢-*-*姜黄烯（*dehydro- -curcumene*），花侧柏萜烯（*cuparene*）等；还有倍半萜酮约4%，内有：*-*及*-*花侧柏萜酮（*cuparenone*），麦由酮（*mayurone*），韦得醇-*-*环氧化物（*widdrol -exoxide*）；又有单萜酸约4%。【性味】苦；辛；性温【功能主治】驱风除温；解毒疗疮。主风寒温痹；历节风；霍乱转筋；牙齿肿痛；恶疮；疥癩 百考试题 - 全国最大教育类网站(100test.com)【用法用量】内服：研末，3-6g.外用：适量，捣敷；或研末调敷；或煎水洗。来源：考试大的美女编辑们【附方】治霍乱转筋：先以暖物裹脚，然后以柏树木细挫，煮汤淋之。（《经验后方》）【摘录】《中华本草》更多信息请访问：执业药师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 百考试题执业药师加入收藏 相关推荐：2010年中药鉴定中药材：柏子仁 2010年中药鉴定中药材：柏脂 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com