

2010年执业西药师：甲硝唑的药物相互作用执业药师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_2010\\_E5\\_B9\\_B4\\_E6\\_89\\_A7\\_c23\\_645878.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E6_89_A7_c23_645878.htm)

甲硝唑可减缓口服抗血凝药（如华法林等）的代谢，而加强其作用，使凝血酶原时间延长。与土霉素合用可干扰甲硝唑清除阴道滴虫的作用。抑制乙醛脱氢酶，因而可加强乙醇的作用，导致双硫醒反应。在用药期间和停药后1周内，禁用含乙醇饮料或药品。饮酒后可能出现腹痛、呕吐、头痛等症状。（1）本品能加强华法林和其他口服抗凝药的作用，引起凝血酶原时间延长。来源：考试大的美女编辑们（2）同时应用苯妥英、苯巴比妥等诱导肝微粒体酶的药物，可加速本品排泄，使血药浓度下降；而苯妥英的排泄减慢。（3）同时应用西咪替丁等减弱肝微粒体酶活性的药物，可减缓药物的清除，延长本品的半衰期。来源：考试大（4）同时应用本品和双硫仑的患者若饮酒可出现精神症状，故二周内使用双硫仑者不应再用本品。本品能致使华法林的 $t_{1/2}$ 延长而加强其疗效。用药期间应忌酒，否则，可发生戒酒硫样作用，表现为颜面潮红、脉搏加快、呼吸困难、斑疹，继之面色苍白、低血压、心律不齐等。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)