

2010年执业西药师：甲硝唑的给药说明执业药师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E6_89_A7_c23_645880.htm

甲硝唑对某些动物有致癌作用，曾发现接受本品治疗患者的尿液对细菌有诱发作用。重复一个疗程之前，应做白细胞计数。厌氧菌感染合并肾功能衰竭者，给药间隔时间应由 8 小时延长至 12 小时。致癌、致突变：动物实验或体外测定中发现本品具致肿瘤和致突变作用，但人体中尚未证实。（1）用药期间不应饮用含酒精的饮料。本文来源：百考试题网（2）肝功能严重损害者本品代谢缓慢，药物及其代谢物易在体内积蓄，应予减量，且应作血药浓度监测。（3）某些放置胃管作吸引减压的患者，本品可经胃液持续清除，引起血药浓度下降。无尿患者血透时，本品代谢物迅速被清除，故给药剂量不必减量。（4）念珠菌感染者应用本品，其症状会加重，需同时给抗念珠菌的药物。（5）可引起轻度粒细胞减少，用药前后需检查血象。

来源：www.examda.com（6）药物不应与含铝的针头和套管接触，静滴速度宜慢，并避免与其他药物一起滴注。治疗滴虫病时需每日更换衣裤，免致重复感染，配偶也应同时接受治疗。采用阴道给药时，可能使并存的念珠菌病恶化。服药后尿液可呈深红色，此系本品代谢产物所致。应用期间应减少钠盐摄入量，如食盐过多可引起钠潴留。更多信息请访问：

：执业药师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 百考试题执业药师加入收藏 相关推荐：2010年执业西药师：甲硝唑的不良反应 2010年执业西药师：甲硝唑的药物相互作用

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

