

2010年执业西药师：甲硝唑的禁用慎用执业药师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E6_89_A7_c23_645881.htm

禁用：（1）孕妇及哺乳期妇女禁用。有活动性中枢神经系统疾患和血液病者亦禁用。来源：考试大（2）原有肝脏疾患者，剂量应减少。出现运动失调或其他中枢神经系统症状时应停药。慎用：来源：考试大（1）孕妇：药物可透过胎盘、迅速进入胎儿循环。动物实验发现腹腔内给药对胎仔具毒性，而口服给药并无毒性。本品对胎儿的影响尚无足够和严密的对照研究，因此孕妇只有具明确指证时才选用本品。（2）本品在乳汁中的浓度与血中浓度相似。乳母是否停药或中断授乳取决于用药的必要性。若必须用药，应中断授乳。（3）年人用本品时药动学有所改变，因此需监测血药浓度。（4）对本品和其他咪唑类药物有过敏史者应禁用。（5）本品为硝咪唑类药物，血液恶液质者应慎用。来源：www.100test.com 动物实验中有致癌、致畸胎、致突变作用。哺乳期妇女、妊娠3个月内的孕妇、有中枢神经系统病变和血病患者禁用。有肝脏病者剂量宜减少。更多信息请访问：执业药师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 百考试题执业药师加入收藏 相关推荐：2010年执业西药师：甲硝唑的不良反应 2010年执业西药师：甲硝唑的给药说明 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com