

2010年执业西药师：甲硝唑的用法用量执业药师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E6_89_A7_c23_645882.htm

用药用法：1.成人常用量百考试题论坛 肠道阿米巴病一次 0.4- 0.6g，一日 3次，疗程 7日；肠道外阿米巴病一次 0.6-0.8g，一日 3次，疗程20日。 贾第虫病，一次0.4g，一日 3次，疗程 5-10日。 麦地那龙线虫病，一次 0.2g，一日 3次，疗程 7日。 小袋虫病，一次 0.2g，一日2次，疗程 5日。 皮肤利什曼病，一次 0.2g，一日 4次，疗程 10日，间隔 10日后重复一疗程。 滴虫病，一次0.2g，一日 4次，疗程 7日；可同时用栓剂，每晚 0.5g置入阴道内，连用 7-10日。 厌氧菌感染，静脉给药首次按体重 15mg/kg（70kg成人为1g），维持量按体重 7.5mg/kg，每 6-8小时静脉滴注一次，临用时将药物稀释至 8mg/ml以下，于 1小时内缓慢滴完。口服剂量为每日 0.6-1.2g，分 3次服，7-10日为一疗程。2.小儿常用量 阿米巴病，每日按体重 35 50mg/kg，分 3次口服，10日为一疗程。 贾第虫病，每日按体重 15 25mg/kg，分 3次口服，连服 10日；治疗麦地那龙线虫病，小袋虫病、滴虫病的剂量同贾第虫病。 厌氧菌感染的注射剂量同成人，口服为每日按体重 2050mg/kg. [制剂与规格]甲硝唑片0.2g甲硝唑栓0.5g甲硝唑注射液100ml：05g来源：考试大的美女编辑们 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com