

2010年执业西药师：吗啡对平滑肌的作用执业药师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E6_89_A7_c23_645906.htm

1.胃肠道平滑肌：吗啡升高胃肠道平滑肌张力、减少其蠕动。吗啡通过局部作用以及中枢抑制作用，减弱便意和排便反射，因而易引起便秘。 2.胆道平滑肌：治疗量吗啡引起胆道奥狄括约肌痉挛性收缩，使胆道排空受阻，胆囊内压明显提高，可致上腹不适甚至胆绞痛。阿托品可部分缓解。 3.其他平滑肌：来源：考试大 吗啡降低子宫张力可延长产妇产时程；来源：www.examda.com 提高输尿管平滑肌及膀胱括约肌张力，可引起尿潴留；治疗量对支气管平滑肌兴奋作用不明显，但大剂量可引起支气管收缩，诱发或加重哮喘，可能与其促进柱状细胞组胺的释放有关。更多信息请访问：执业药师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 百考试题执业药师加入收藏 相关推荐：2010年执业西药师：吗啡的镇静、致欣快作用 2010年执业西药师：吗啡抑制呼吸的作用 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com